• The Kalcker Parasite Protocol •

Healing the symptoms known as Autism



Second Edition

PDF E-Book

Kerri Rivera

with Kimberly McDaniel & Daniel Bender

Jim Humble • Dr. Andreas Kalcker

Dr. Marco Ruggiero • Robert L. Sands

Machine Translated by Google

(Many thanks to Kerri Rivera for allowing this chapter of her book to be freely shared with those who need this important information.)

Bölüm 8

Aşama 3
Kalcker Parazit Protokolü

Tüm babaları mı z, kültürel uygulamaları nı n bir parçası olarak parazit tedavisi gördü. Modern pratiğe güvendiğimiz için bundan uzaklaştı k. Bu alanda ataları mı zı n yöntemlerini yeniden öğrenmek ve kendimizi her zaman nispeten sağlı klı tutmak için oldukça iyi yaparı z.

~ Şef İki Ağaç

"Parazit" kelimesi, "yemek yiyen" anlamına gelen Yunanca kelimeden gelir. başkası nı n masası ndan. Eski zamanlı lar için parazitler, başkası nı n masası na oturdu ve yemeklerini pohpohlayarak ödedi.

Kitapta daha önce de bahsettiğim gibi, CD lavmanları nda çok ilginç bir şey olmaya başladı . Daha önce lavmanlarla çı kan mukus veya biyofilm olduğuna inandı ğı mı z şeylerin çoğu durumda solucanlar (helmintler) (parazitler olarak da bilinir) olduğu ortaya çı ktı - nadir durumlarda hala hayattaydı lar ve tuvalette kı pı rdanı yorlardı ! En yaygı n olanı n Ascaris lumbricoides (yuvarlak kurt) olduğuna inandı k . Bununla birlikte, Dr.Gubarev, Dr.Alex Volinsky ve iş arkadaşları tarafı ndan keşfedilen (14 Ocak 2013'te sunuldu) potansiyel yeni bir helmint türü olan halat parazitlerini giderek daha fazla görüyoruz. Kesin olarak söylemenin tek yolu DNA testi, ancak minimum 100 test vakası ile her analiz için 25.000 ABD doları olması şu anda oldukça maliyetli.1 Ascaris ve halat parazitlerine ek olarak, ebeveynler kancalı kurtlar da görmüşlerdir. pinworms, tenyalar ve şanslar, diğerleri arası nda. Bu, pek çok çocuğumuz için yapbozun son derece önemli bir parçası dı r. Birinci dünya ülkelerinde parazitlerin bir sorun olmadı ğı na inandı rı ldı k. Bu kesinlikle böyle değil.

İyi yı kanmı ş bir parazit. Neredeyse dokuyu hissedebilirsiniz.

Machine Translated by Google

Bölüm 8

Andreas Kalcker,
ortak yazar
Kalcker Parazit Protokolü

Miriam Carrasco Maceda,
ortak yazar
Kalcker Parazit Protokolü

Dr. Andreas Kalcker ve Miriam Carrasco Maceda'nı n yakı nda yayı nlanacak olan Parasites:

The Silent Enemy adlı kitapları ndan bir bölümü paylaşmaları ndan onur duydum . Andreas, yaşam boyu solucanları yok etmenin önemini açı klı yor ve birçok çocuk ve yetişkinin daha sağlı klı olması na yardı mcı olan bir protokolü bizimle paylaşı yor; ve spektrumdaki bazı çocuklar için, onları iyileşmeye götüren son parça eklendi.

Burada yer alan sürüm, OSB'li çocuklar ve yetişkinler için özel olarak hazı rlanmı ştı r. Orijinal protokol şu adreste bulunabilir:

www.andreaskalcker.com/
index.php/en/health/parasite

Çok az ayrı ntı değiştirildi, ancak buradaki Parazit Protokolünün, iyileşen çocukları n çoğu da dahil olmak üzere spektrumdaki birçok çocuğumuza yardı mcı olduğu kanı tlanmı ştı r.

Andreas ve Miriam'a bu harekete değerli katkı ları nı z için, özverili bir şekilde bulguları nı zı paylaştı ğı nı z ve her zaman yardı m etmek için zaman ayı rdı ğı nı z için teşekkür ederiz.

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü

NASIL TESPİT EDİLİR VE PARAZİT ENFEKSİYONUNU TEDAVİ EDİN

Paraziter enfeksiyonlar çoğu insanı n düşündüğünden daha yaygı ndı r ve ciddi sağlı k sorunları na yol açabilir veya açmayabilir. Vücutta veya vücutta büyüklükleri ve yerleri değişen çok sayı da parazit türüyle enfekte olabiliriz.

Parazitler, sı tma gibi yalnı zca mikroskop altı nda görülebilen mikroparazitler veya yuvarlak veya düz bağı rsak solucanları (yuvarlak solucanlar, tenyalar, vb.) Gibi büyük makroparazitler olarak sı nı flandı rı labilir. Bunlar çı plak gözle görülebilir ve büyük boyutlara ulaşabilir. İç parazitler sanı ldı ğı gibi sadece bağı rsaklarda değil, akciğer, karaciğer, kas, mide, safra kesesi, beyin, kan, deri, eklemler ve hatta gözlerde olmak üzere vücudun her yerinde bulunur.

Yakı n tarihte, hı zlı ulaşı m ve yaygı n ticaret yoluyla insan nüfusunun büyük göç hareketleri, daha önce insanları ve hastalı kları ayı ran mesafeleri kı saltmı ştı r. Eskiden lokalize olan hastalı klar böylece evrensel rahatsı zlı klar haline geldi. Önceleri çok özel coğrafi bölgelere hapsolmuş olan parazitler, artı k ilk anavatanları ndan çok uzakta, başka yerlerde ortaya çı kı yor. Ne yazı k ki, (küresel nüfusun büyük bir yüzdesinin yaşadı ğı) alt sosyoekonomik tabakalara özgü koşullar, hastalı kları n ve parazitlerin bulaşması nı destekleme eğilimindedir.

Dünya nüfusunun yüksek bir yüzdesi, DSÖ'nün (Dünya Sağlı k Örgütü) yı lda 15 milyon çocuk ölümünden sorumlu olduğunu tahmin ettiği parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlardan muzdariptir. Ölümlerin temsil ettiği büyük maliyete ek olarak, parazitler çoklu kaçma mekanizmaları ve spesifik bağı şı klı ğa karşı direnç geliştirdikçe kronik ve kalı cı enfeksiyonlar artmı ştı r.
Bu, konak bağı şı klı k tepkisini atlatmaları na ve iptal etmelerine izin verir.

İnsan konakçı larda kalı cı parazitik enfeksiyon, doku hasarı na ve değişen bağı şı klı k düzenlemesine neden olabilen kronik bağı şı klı k reaksiyonları na yol açar. Dünya nüfusunun yüzde doksanı bir veya daha fazla parazitle enfektedir ve aynı konakçı da beşe kadar farklı tip bir arada bulunabilir.

Konakçı nı n iç dengesi bozulduğunda, parazit sayı sı birdenbire arttı ğı nda ve konakçı ölümle bile sonuçlanabilecek ciddi hastalı k belirtileri göstermeye başladı ğı nda bu durum tehlikeli bir hal alı r. Ancak bazı durumlarda parazit solucan enfeksiyonları hastalı kla sonuçlanmaz, aslı nda bir takı m taşı yı cı ları n sağlı klı olduğu tespit edilir.

Machine Translated by Google

Bir parazite gerçekten iyi bir bakı ş. Parazitin gerçek bağı rsakları nı görebilirsiniz. Helmint olarak da bilinir.

Aynı parazit (yukarı daki gibi) farklı bir açı dan.

Machine Translated by Google

3. Adım - Kalcker Parazit Protokolü Çoğu insanın bulaştığını n farkında bile olmadığı düşünülürse, parazitler sessiz katiller haline geldiler ve tehlikeden habersiz hayatlarını sürdüren pek çok masum kurbanın hayatına mal oldular. Batı Avrupa ve ABD'deki bazı doktorlar, enfekte olabileceğimizi düşünmek bile istemiyor gibi görünüyor.

Son zamanlarda kıtalar arası seyahat, göç ve ticaretteki artış dikkate alındığında, sorunun şimdi nasıl endişe verici bir boyuta ulaştığını görmek zor değil. Parazitler, özellikle de modern "zehirlenmiş" versiyonları, pekala, artık daha yaygın hale gelen pek çok nadir hastalığın yanısıra kronik yorgunluk, fibromiyalji ve artrit gibi yakın zamanda tanımlanmış veya büyümekte olan diğer sorunlara da neden olabilir.

En yaygın verminoz (parazitik solucanların neden olduğu bariz hastalık semptomatolojisi olan veya olmayan istila) bağırsaktır. Onlara sahip olan insanlar, yalnızca (parazitler tarafından emilen) büyük miktarda besin kaybından değil, aynı zamanda çeşitli enfeksiyonlara ve olası otoimmün eksikliklere kapı açabilen solucanlar tarafından sindirim sisteminde yapılan deliklerden de muzdariptir. Bağırsak solucanı enfeksiyonları çok yaygındır ve yalnızca kötü hijyen alışkanlıkları olan insanları değil herkesi etkileyebilir. Helmintler (solucanlar), daha sonra bağırsak sisteminde yumurtadan çıkan parazitlerin yumurtalarını veya larvalarını yutarak bulaşır.

Bir parazit enfeksiyonu veya yeniden enfeksiyon, aşağıdaki yollardan biri veya daha fazlası aracılığıyla edinilebilir:

X Enfekte bir kişiyle (fekal veya cinsel) az çok doğrudan temastan.

X Kendi kendine enfeksiyondan, örneğin anal-el-ağız teması yoluyla. Anal bölgeyi kaşıyarak yumurtalar tırnakların altına yerleşebilir.

X Doğuştan bulaşmadan (anneden fetüse).

X Genel olarak kirlenmiş nesnelerden.

X İnsan veya hayvan dışısı ile kirlenmiş topraktan.

X Kirlenmiş çiğ veya az pişmiş et yemekten.

X Çiğ balık yemekten.

Bazı ülkelerde çiğ balık geleneksel yiyecekler arasında yer almaktadır. Sıcaklığa bağlı olarak eti veya balığı en az on iki saat dondurarak larva veya solucanların tüketimini önleyebiliriz.

Machine Translated by Google

Ascaris lumbricoides olduğuna inanı lan ölü bir parazitin veya muhtemelen "yosun" aşaması ndaki bir ip kurdunun harika bir fotoğrafı .

Bazı helmintlerin ne kadar uzun oldukları na çok iyi bir bakı ş. İnsanlar ne kadar çok solucan geçirirlerse o kadar sağlı klı olurlar ve iyileştirmeler gittikçe daha hı zlı gerçekleşir. Bu çocuk başlangı çta çok fazla parazit geçirdi. Sonra birkaç ay sonra artı k onları geçmiyordu ve şimdi ATEC puanı 5'e sahip. Yani artı k otizm teşhisi yok.



Bu 32 inç ölçen parazit.

Machine Translated by Google

Koleksiyon için başka bir uzun, iyi yı kanmı ş parazit. İyileşmeye giden yol birçok ölü parazitle döşenmiştir. Adios Otizm...

Bu, genç bir çocuğun geçtiği 32 inçlik bir parazit. Bunu çı kardı ktan sonra harika bir gün geçirmeye devam etti.

Machine Translated by Google

Bunlar, Dr. Alex Volinsky tarafı ndan onaylanan ip parazitleridir.

60cm uzunluğunda solucan (1 Ekim 2013) çocuktan; CD'de 6 ay; 1-2 saatte bir 2 damla; parazit protokolü yok; 1 yemek kaşı ğı DE; 2-3 şişe Quinton.

Machine Translated by Google

Bu 33 inçlik parazit ("Chester" olarak da bilinir), protokolü kendi üzerinde kullanan bir kadı n tarafı ndan keşfedildi.

Bu fotoğrafta görünen kabarcı k, bunun geç evre bir ip kurdu olduğuna inanmamı za neden oluyor.

Machine Translated by Google

Bölüm 8

Bu paraziti geçtikten sonra çocuk okulda harika bir gün geçirmeye devam etti. Kendinizi iyi ve sağlı klı hissetmek çok güzel.

FDA, [balı kları n] -4°F (-20°C) veya altı nda yedi gün (toplam süre) boyunca dondurulması nı ve saklanması nı veya katı laşana kadar -31°F (-35°C) veya altı nda dondurulması nı ve saklanması nı önerir. -31°F (-35°C) veya altı nda 15 saat süreyle veya -31°F (-35°C) veya altı nda katı laşana kadar dondurma ve -4°F (-20°C) veya altı nda 24 saat depolama saat parazitleri öldürmek için yeterlidir. FDA'nı n Gı da Kodu, bu dondurma koşulları nı çiğ tüketim amaçlı balı k sağlayan perakendecil Not: Bu koşullar özellikle büyük balı kları n (örn. 15 cm'den kalı n) dondurulması için uygun olmayabilir.2

X Kirlenmiş su içmekten.

X Kirlenmiş sebze veya meyveleri tüketmekten. Genellikle kötü yı kanmı ş (parazit istilası na uğramı ş) sebze veya meyveler yeriz. Organik tarı mdan elde edilen sebzelerin herhangi bir sorun, böcek ilacı veya kimyasal madde içermediği konusunda yaygı n bir yanı lgı vardı r. Tehlike, solucanları n yumurta veya larvaları nı n hayvan atı kları , doğal kompostun ayrı şmı ş formları ve tarlaya eklenen gübre (gübre) yoluyla çiftlik toprağı na ulaşması dı r. Ascaris lumbricoides gibi aşı rı sı caklı klarda toprakta beş yı l yaşayabilen yumurtalar vardı r. Meyve ve sebzelerin derinlemesine temizlenmesi çok önemlidir ve ne kadar sağlı klı görünürse görünsün asla çiğ ve doğrudan yerden yemeyin.

X Parazit bulaşmı ş hayvanlardan. Paraziter enfeksiyonları n evcil hayvanlarla temas yoluyla yayı lması çok kolaydı r. Veterinerler, hayvanları mı zı n üç ayda bir haşarattan arı ndı rı lması konusunda ı srar etmekte acele ediyorlar, ancak kontaminasyonu önlemek için kendi başı mı za almamı z gereken adı mlar var.

Machine Translated by Google

Parazitler tüm şekil ve boyutlarda gelir. Tabii parça parça da çı kabilirler.

Önerilen: Veteriner hekiminizin belirttiği şekilde, evcil hayvanı nı zı n solucanı nı ömür boyu en az üç ayda bir temizleyin. İlk ay boyunca her hafta yapı lmalı dı r.
Evcil hayvanları n çiğ iç organları yemesini önleyin. Hayvanlar çiğ et veya çiğ kemik yerse en iyi seçenek, yiyeceği en az 12 saat önceden dondurmaktı r (Yukarı daki alı ntı ya bakı n). Böcek giderme tedavisi işe yarı yorsa, hayvan sekiz günlük tedavi sı rası nda daha sonra yakı lması veya gömülmesi gereken dı şkı veya kusmuktaki solucanları dı şarı atacaktı r.

Dı şkı , toprak ve kendi anüsleri ile doğrudan temas halinde oldukları için hayvanlar tarafı ndan ağı zda yalanmaktan kaçı nı n. Bir hayvanı okşarken, parazit yumurtaları hayvanı n tüylerinde kaldı ğı ndan, yemek yemeden veya yiyeceklere dokunmadan önce ellerinizi sabun ve suyla yı kayı n.

X Toprakta veya kumda çı plak ayakla veya açı k ayakkabı larla yürümeyin.

X Hipoterapiden (ata binme) kaçı nı n

Paraziter Enfeksiyonları n Belirtileri

Parazitler tarafı ndan vücudumuzda üretilen farklı solucan türleri ve zehirli atı klar aşağı daki yaygı n sorunlara neden olabilir:

Machine Translated by Google

Parazitler her boyutta gelir. Bazı ları çok uzun. Bunlar fotoğraflar için sı cak su ile yı kanı r. Bu şekilde onları en iyi şekilde görebiliriz.

Kan Bozuklukları ve Kan Parazit Hastalı kları

Parazitler vücuttan demir, B12 vitamini ve şekerler gibi temel besinleri emerek belirli kan bozuklukları na neden olabilir. Ayrı ca bazı hastalı kları n kan parazitlerinden kaynaklandı ğı bilinmektedir:

Kan hastalı kları :

- Anemi •
  Baş dönmesi
- Hipoglisemi •
  Halsizlik

Kan parazit hastalı kları :

- Afrika Uyku Hastalı ğı •
  Babesiosis • Chagas Hastalı ğı
- Sı tma

Tükenmişlik:

Parazitlerin kendileri tarafı ndan üretilen zehirli atı klar (amonyak ve psikoaktif maddeler dahil), detoks organları nı zorlayabilir ve aşağı daki gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları na neden olabilir:

Machine Translated by Google

3. Adı m - Kalcker Parazit Protokolü • Kronik yorgunluk sendromu (CFS) • Ekstremitelerde soğuk algı nlı ğı

• baş dönmesi

• Aşı rı zayı flı k

• İç soğuk

• Uyuşukluk • Düşük enerji • Gece uyanmaları • Huzursuz uyku

Gastrointestinal Belirtiler

• Karı n ağrı sı veya hassasiyeti • Dı şkı da kan

• Midede yanma • Kronik kabı zlı k • Kronik ishal veya gı danı n zayı f emiliminden kaynaklanan ishal

• Kolit

• Kramp • Yağlı ve şekerli yiyecekler, bol miktarda karbonhidrat ve ekmek için istek, meyve, meyve suları , alkol veya sirke • Sindirim sorunları • Karı n şişkinliği • Normalden daha fazla yemek yeme ancak yine de aç hissetme • Aşı rı bağı rsak hareketleri

• Ateş

• Sı k kusma ve mide bulantı sı • Gaz ve şişkinlik (yemekten sonra görülür) • Hemoroid

• İrritabl bağı rsak sendromu (IBS)

• bağı rsak tahrişi

• Bağı rsak tı kanı klı ğı

• Sı zdı ran bağı rsak • Malabsorpsiyon sendromu

• Dı şkı da mukus

• Pankreatit

• Dı şkı da solucan geçmesi

Machine Translated by Google

Büyüme Sorunları , Kilo ve İştah

Parazitler genellikle konakçı tarafı ndan algı lanmadan yaşarlar. Tüketilen gı dadaki temel besin maddelerinin çoğunu vücudu soyarlar. Parazit bulaşmı ş birçok aşı rı kilolu insan, temel besin maddelerinin eksikliği nedeniyle aç kalı r ve parazit enfeksiyonu nedeniyle fazla yemek yemelerine neden olur. Ayrı ca istilanı n türüne göre birçok kişi yetersiz besleniyor ve kilo alamı yor. Aşağı da bazı olası semptomları n bir listesi bulunmaktadı r:

Çocuklarda:

- Zayı f büyüme •
  Biyolojik yaşları yla uyumlu zayı f fiziksel ve entelektüel gelişim

Çocuklarda ve yetişkinlerde:

- Kronik geğirme • Beyaz
  unlu ürünleri aşerme; kurabiyeler, kekler, hamur işleri vb. • Yemekten sonra
  acı kma
- Kilo alamama veya verememe • Uzun
  süreli obezite • İştah kaybı • Tatlı lar
  veya çok özel yiyecekler (buğday, şeker,
  süt ürünleri) yemeye yönelik saplantı ve/veya zorlama • Aşı rı iştah • Her zamankinden
  daha fazla yemek için kontrol edilemeyen açlı k • Kilo alı mı (özellikle dolunay
  zamanı civarı nda) • Kilo kaybı

Duygudurum Sorunları ve Kaygı

Parazitler tarafı ndan salı nan toksinler, merkezi sinir sistemini tahriş edebilir.
Anksiyete ve sinirlilik genellikle vücutta dolaşan parazitlerden kaynaklanı r. Ortaya çı kan sorunlardan bazı ları şunlardı r:

- Öfke ve sinirlilik • Anksiyete •
  Karı şı k düşünme (beyin
  sisi) • Depresyon • Oryantasyon
  bozukluğu • Unutkanlı k • Koordinasyon
  eksikliği • Ruh halinde dalgalanmalar

Machine Translated by Google

• Sinirlilik • Saplantı
• Huzursuzluk • Yavaş
refleksler

Kas ve Eklem Ağrı sı

Parazitler vücutta hemen hemen her yere gidebilirler. Eklemlere ve kaslara göç ettiklerinde kistlere ve iltihaba neden olabilirler. Bunlar sı klı kla artrit ve/veya kas ağrı sı ile karı ştı rı labilir.

Parazitlerden gelen toksinler ayrı ca eklemlerde ve kas dokusunda birikerek aşağı dakilere neden olabilir:

• Göğüs ağrı ları
• Fibromiyalji • Eklem
ağrı sı • Kas
krampları • Kas
spazmları • Ellerde
veya ayaklarda uyuşma • Sı rt, uyluk veya
omuzlarda ağrı • Göbek ağrı sı • Hı zlı kalp
atı şı • Huzursuz bacak sendromu • Nöbetler

Çocuklarda Parazitler (OSB'li çocuklar dahil)

Parazitler vücutta asemptomatik ve semptomatik evrelerde bulunabilir.
İlki genellikle yetişkinlerde bulunur. Semptomatik aşamalar, çoğunlukla aşağı dakileri sı klı kla gözlemleyebileceğimiz çocuklarda görülür:

• anoreksiya
• Anksiyete •
Bruksizm (diş gı cı rdatma) •
Kramp • Kabı zlı k dönemleriyle
birbirini izleyen ishal • Aşı rı kanat çı rpma • Büyüme geriliği

• baş ağrı sı
• Kilo alamama • Anüste
kaşı ntı /Yanma/toplanma • Burun kaşı ntı sı
ve/veya anal ürtiker (kurdeşen/döküntü) • Sinirlilik ve sinirlilik

Machine Translated by Google

• Burun
karı ştı rma • OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
• Öfke • Dı şkı bulaştı rma • Açı klanamayan
kahkaha veya ağlama • Sözlü uyaranlar

• Kilo kaybı

Tenyalar ve diğer bazı parazitler, B12 ve demir için bir afiniteye sahiptir.
Bu nedenle, B12 ve/veya demir eksikliklerini gösteren laboratuvar sonuçları ,
parazitik enfeksiyonları n göstergesi olabilir.3,4 Tenya, boyutu nedeniyle, çocuğun yiyeceğini alarak elde ettiği yiyeceği çok büyük miktarlarda tüketir. Bu, çocuğun normal gelişimini etkileyebilir.

Tedavi basittir, ancak tenyanı n başı nı n çı karı lması nı gerektirir, aksi takdirde büyümeye devam edecektir. Tenya tedavisi bu protokolden ayrı dı r ve genellikle niklozamid gerektirir. Bununla birlikte, başı n çı karı lmı ş olduğundan emin olmanı n tek yolu, onu dı şkı da tespit etmektir.

Solunum yolları rahatsı zlı ğı

Larvaları n solunum sisteminden geçişi veya akciğerlerde larva istilası aşağı daki gibi semptomlara neden olabilir:

• Akut bronşit • Astı m
• Uyuşukluk • Dispne
(nefes darlı ğı ; hava
açlı ğı) • Kronik/tahriş edici öksürük • Pnömoni
• Nefes darlı ğı veya solunum yetmezliği

Cinsel ve Üreme Bozuklukları

Parazitik bir enfeksiyonun bir sonucu olarak bağı şı klı k disfonksiyonu şunlara yol açabilir:

• Candida - maya enfeksiyonları
• Kistler ve fibroidler
• Erektil disfonksiyon
• Sı vı tutulumu
• Erkek iktidarsı zlı ğı
• Adet sorunları • Adet
öncesi sendromu • Prostat
sorunları • İdrar Yolu
Enfeksiyonları

Machine Translated by Google

Cilt Bozuklukları ve Alerjiler

Cilde nüfuz eden dış parazitler (bit, tahtakurusu, uyuz vb.) kaşıntı, kızarıklık ve/veya kızarıklık vb. neden olabilir. Ancak iç parazitler de cilt bozuklukları ndan sorumlu olabilir. Parazitler toksik metabolik atık oluştururlar ve cilt en büyük organ olduğu için vücut parazitleri parazitler aracılığıyla ortadan kaldırmaya çalışır ve bu da birçok cilt problemine neden olur.

Bazı belirtiler şunları içerebilir:

• Alerjiler (gıdalara, toza, küfe vb. karşı) • Anal kaşıntı Kırılgan saçlar •

• Deri altında sürünme hissi • Dermatit

• Kuru saç • Kuru cilt • Egzama

• Döküntüler • Saç dökülmesi •

Kaşıntılı burun •

Kaşıntılı cilt • Sarılık • Sedef hastalığı

• Cilt ülserleri • Yaralar

• Şişlik • Ürtiker (kurdeşen; deri döküntüsü)

Uyku bozuklukları

Vücut dinlenme dönemlerinde parazitlere tepki verir, çünkü gece parazitlerin en aktif olduğu zamandır. Gece uyanmaları, karaciğerin vücudu parazitler tarafından üretilen toksinlerden arındırmaya çalıştığı, özellikle sabah 2 ile 3 arasında yaygındır. Bu da şunları üretebilir:

• Uykusuzluk hastalığı

• Diş gıcırdatma • Yatak ıslatma • Uyurken salya akması • Uyku bozuklukları - gece boyunca birden fazla uyanma • Huzursuz uyku

Machine Translated by Google

- Ağı z kokusu
- Bulanı k görüş
- Vücut kokusu
- Solunum Problemleri
- Kronik enfeksiyonlar: viral veya bakteriyel
- Dolaşı m sorunları , ekstremitelerde uyuşma, hareket güçlüğü hareketli
- Öksürme veya öksürme kan
- Yutma güçlüğü
- Aşı rı tükürük
- Ateş
- Dolunay sı rası nda sı vı birikmesi veya tutulması .
- Düşük bağı şı klı k tepkisi
- Peritonit
- Yabancı bir cisim hissi veya boğazda rahatsı zlı k • Şişmiş gözler •

Dolunay sı rası nda kilo alı mı .

Kan tahlili

Aşağı daki belirteçler, bir kişi parazitik bir enfeksiyondan veya bunun sonucunda ortaya çı kan alerjilerden muzdarip olduğunda mevcut olabilir:

- Anemi/düşük demir
- Yükselmiş immünoglobulin (IgE) •

Yükseltilmiş eozinofiller (Eozinofil, bağı şı klı k sisteminin özelleşmiş bir hücresidir, daha spesifik olarak proinflamatuar bir beyaz kan hücresidir. Eozinofilik Gastrointestinal Bozukluklar Siciline (REGID) göre, bunları n bilinen işlevleri arası nda iltihaplı bağı rsaklara hareket yer alı r. alanlar, yakalama maddeleri, hücreleri öldürme, antiparazitik ve bakterisidal aktivite, alerjik reaksiyonlara katı lma ve inflamatuar yanı tları modüle etme.)

- Yüksek amonyak
- Yüksek oksalat •

Düşük B12 vitamini

Machine Translated by Google

Yeniden Enfeksiyonu Önlemek İçin Ev Ortamı nda
Alı nacak Önlemler

Birinin başkaları na bulaştı rması nı önlemek için aynı ortamda yaşayan tüm insanları ve evcil hayvanları tedavi etmek önemlidir. Yeniden enfeksiyon, iç çamaşı rları , yatak takı mları , havlular ve çocuk oyuncakları gibi ev eşyaları veya yumurtalarla temas etmiş hayvanlar yoluyla gerçekleşir. Vücudun mahrem bölgeleriyle temas eden tüm giysilerin 60°C'nin (140°F) altı nda olmayan bir sı caklı kta yı kanması önemlidir.

Tüm yatak örtüleri ve iç çamaşı rları , anti-parazitik tedavi yapı lı rken günlük olarak (veya mümkün olduğu ölçüde) yı kanmalı dı r. Etkilenen bireyler, mayoları nı ailenin diğer üyeleriyle paylaşmamalı ve anal bölgesini yı kamak için ayrı bir bez kullanmalı dı r. Gece boyunca istemsiz kaşı nmayı önlemek için hem iç çamaşı rı hem de pantolon giyerek uyumak en iyisidir. Bu, anal-el-ağı z teması yoluyla enfeksiyonu önleyecektir çünkü anal bölgeyi kaşı yarak yumurtalar tı rnakları n altı na yerleşebilir. Yatak, kanepe, battaniye ve minder gibi evcil hayvanları sahiplerinin bulunduğu yerlerden uzak tutun.

Meyve ve sebzeleri suyla iyice yı kayı n ve birkaç dakika CD veya CDS solüsyonunda bekletin. Birçok parazitin yumurtaları sabun veya çamaşı r suyu gibi normal temizlik ürünlerinin pH'ı na karşı bağı şı k olduğundan, lavaboyu alkolle temizleyin. Parazitlerin konakçı da herhangi bir bağı şı klı k bı rakmadı ğı na dikkat etmek önemlidir, bu nedenle, bir kez iyileştikten sonra, acı çeken kişi onlardan tekrar muzdarip olabilir. Ascaris lumbricoides yumurtaları nı öldürmenin tek kesin yöntemi, 60°C'nin (140°F) üzerindeki suda veya %96 tahı l alkolü (Everclear) kullanmaktı r.

Bağı rsak
Parazitlerinin Evrim Döngüleri

Çok daha fazlası olması na rağmen, gelişmiş ülkelerde bulunabilecek en yaygı n üç bağı rsak paraziti türünün açı klaması aşağı da verilmiştir:

Ascaris Lumbricoides (yuvarlak kurt)

Ascaris , tek bir dişi her gün 200.000'e kadar yumurta bı rakabileceğinden hı zla ürer. Bu parazit, özellikle nemli koşullarda ve hijyen önlemlerinin yetersiz olduğu durumlarda çok yaygı ndı r. Tüm popülasyonu etkileyebilir, ancak çoğunlukla çocukları etkiler, gelişimlerini ve büyümelerini ciddi şekilde bozar.
O kadar bulaşı cı ki, DSÖ dünya çapı nda yaklaşı k 700.000.000 kişinin enfekte olduğunu tahmin ediyor ve bunları n her yı l yaklaşı k 60.000 vakası , çoğunlukla çocuklar olmak üzere ölümle sonuçlanı yor.5

Machine Translated by Google

Bölüm 8



Parazit yumurtaları konakçı nı n ağzı ndan duodenuma ulaşı r. Mide sı vı ları yumurtaları kabukları ndan ayı rı r ve larvaları serbest bı rakı r. Oldukça hareketli olan bu larvalar duodenal mukozayı delip karaciğere göç ederl Buradan kalbe göçlerini sürdürürler, pulmoner dolaşı m yoluyla akciğerlere ulaşı rlar ve sonunda pulmoner kı lcal damarlarda hapsolurlar. Burada larvalar kı lcal damarları n ince duvarları nı aşar ve alveollere, bronşiyollere ve bronşlara nüfuz eder ve bu noktada farinks boyunca ilerleyebilirler. Yumurtalar epiglotu geçtikten sonra (yukarı daki şemaya bakı n), larvalar, olgunlaşma sürecini tamamlayacakları duodenuma geri dönecek şekilde yutulur. Bu işlemin tamamlanması yaklaşı k iki ila üç ay sürer; bu nedenle kendimizi tamamen parazitsiz bulmak için ilk tedavinin en az 12-18 ay, muhtemelen daha uzun süre yapı lması gerektiğini hesaplı yoruz. Bundan sonra, yı lda yalnı zca iki ila dört kez bir solucan temizleme rutini izlemeniz gerekebilir.

Machine Translated by Google

3. Adım - Kalcker Parazit Protokolü Yumurtaları n

dışkı yoluyla (insan veya hayvan) zorlu koşullarda bile hayatta kalabilecekleri ortama atıldığını ve parazitin kalıcılığını desteklediğini unutmayın. Düşük sıcaklıklara, kuruluğa, güçlü asitlere, sabunlara, klora, formaldehite (pH 2 ile 11,5 arası) dayanıklıdırlar ve ekili topraklarda beş yıl veya daha uzun süre yaşayabilirler ve onları neredeyse yok edilemez kılan bir "parazit yuvası" oluştururlar. Kuruduktan sonra havada taşınırlar, solunabilen ve/veya yutulabilen toz gibi hava akımlarında uçarlar.

Burun mukusundan, kağıt paradan, saksı toprağından, tozdan ve ev içindeki havadaki parçacıklardan vs. yumurtaları kurtardık.

Taenia Saginata ve Taenia Solium (tenya)

Tenialar, insanlar yumurtaları nı enfekte sığır veya domuzlardan alınan dokuları tüketerek yediklerinde insanlara ulaşır. Enfekte hayvanlarda, larvalar kas dokusunda tutulur. Enfekte hayvan tüketilirse insan sindirim sisteminde gelişme devam edebilir. İnsanlar, T. saginata (sığır tenyası) ve T. solium (domuz tenyası) için konakçıdır. Tenya soliter olarak kabul edilir, çünkü genellikle herhangi bir konakçıda dörtten fazla tür bulunmaz. Bu parazitin tehlikesi, larvaların beyne veya diğer hayati organlara göç edebilmesidir (sistiserkoz). Tenyalar, konakçının dışkısında solucanların büyüdükçe attığı bölümleri tanımlayarak tespit edilebilir. Bununla birlikte, tenyalar, konukçuların içinde asemptomatik olarak yaşayarak yıllarca tespit edilemeyebilir.

Sınıflandırmaya göre, boyları 2 ila 12 metre arasında değişen boyutlarda değişebilirler. Bağırsaklara vantuzlarla bağlanan skoleks adı verilen bir kafa ile proglottid adı verilen tekrarlayan birimlerden oluşan bir gövdeden oluşurlar. Tek bir Taenia, türüne bağlı olarak 1.000 ila 2.000 proglottid arasında büyüyebilir. Bir tenya günde ortalama 720.000 yumurta üretir.

Kıl kurdu (Enterobius Vermicularis)

İnsanlar, yaygın olarak kıl kurdu (Enterobius vermicularis) olarak adlandırılanların tek konakçısı olarak kabul edilir . Bu tür solucan, kolayca yayıldığı için ailede en tipik olanıdır. Çocukların okullarda, başkalarıyla temas yoluyla veya anal-el-ağız teması yoluyla yeniden enfekte olmaları yaygındır.
Kıl kurdu uzun bir şekle sahiptir, beyazımsı renktedir ve yaklaşık 1 cm uzunluğundadır. İnsanların kalın bağırsağında yaşarlar. Dişi kıl kurtları yumurtaları nı anüsün çevresine bırakır. Yumurtalar bırakıldıktan sonra 20 güne kadar bulaşıcıdır. Bağırsağa girdikten sonra, beş ila sekiz hafta sürer.

Machine Translated by Google

yetişkin solucanlara dönüşüyor. En önemli semptomu özellikle geceleri anal bölgede ortaya çı kan yoğun kaşı ntı dı r. Kadı nlarda vulvar bölgenin iltihaplanması çok yaygı ndı r.

Bir kı l kurdu enfeksiyonu, genel olarak konuşursak, çok ciddi değildir. Diğer parazitlerin aksine sadece insanları enfekte ederler. İnsandan insana bulaşma, hava yoluyla bulaşabilecek kadar hafif olan kı l kurdu yumurtaları ile kontamine olmuş giysilere, çarşaflara, havlulara ve çevresel yüzeylere (perdeler, halı lar gibi) dokunulması yla gerçekleşir. Az sayı da yumurta, solunduğunda yutulan yumurtalarla aynı gelişim sürecini takip eden hava parçacı kları na entegre edilebilir. Lavmanlar bu parazitin kalı n bağı rsaktan çı karı lması nda son derece faydalı dı r.

Graham'ı n yöntemi basit bir algı lama yöntemidir. Uyandı ktan hemen sonra ve bağı rsak hareketinden önce, anal kı vrı mlara bir parça bant bastı rı n. Bant, orada bulunan yumurta kalı ntı ları nı ve/veya parazitleri yakalayacaktı r. Çı plak gözle bir inçten uzun olmayan küçük solucanları görebiliriz, ancak mikroskopla dişilere ve hatta diğer türlere ait birçok şeffaf yumurta görülebilir.

Ömür Boyu Haşere Önlemenin Önemi

Böceklerden arı ndı rma sürecine bir kez başladı ğı mı zda, sağlı ğı mı zı n tadı nı çı karmak için hayatı mı zı n geri kalanı nda bu temizlik alı şkanlı ğı nı sürdürmemiz gerektiğini kabul etmeliyiz. Evcil hayvan besleyen kişilerin veterinerlerinin tavsiyelerine uyması ve her üç ayda bir evcil hayvanları nı n solucanları nı temizlemesi yaygı n bir durumdur. Aile hekimlerinin insanlara aynı tavsiyeyi neden vermediklerini sormak ilginçtir. Belki de bazı doktorlar bu bilgiyi görmezden geliyor veya hayvanlar için olduğu kadar insanlar için de zararlı olan bu haşereleri ortadan kaldı rmanı n önemli olduğunu düşünmüyor.

Pek çok parazitin belirli iklimlerin dı şı nda endemik veya yaygı n olmadı ğı doğrudur, ancak insan göçü ve gı da ürünlerinin küresel pazarlaması , birçok parazit haşerenin sessizce yayı lması nı kolaylaştı rmı ştı r. Üreme ve ölüm aşamaları da dahil olmak üzere doğumdan ölüme kadar her bir parazitin yaşam döngüsünü anlamamı z önemlidir. Bu bilgi parazitin tamamen ortadan kaldı rı lması için çok önemlidir. Örneğin burada bu protokol ile tedavi edilen bağı rsak parazitlerinde bazı ları tek bir Taenia örneğinde olduğu gibi on yı la kadar konakçı da yaşayabilirken bazı ları ömür boyu konakta kalarak tekrar üreyip çoğalabilir. yine, kı l kurdu veya iyi bilinen Ascaris örneğinde olduğu gibi.

Machine Translated by Google

Adım 3 - Kalcker Parazit Protokolü

Kalcker Parazit Protokolü ve Ay Döngüsü Zamanlaması

İçinde yaşadığımız modern uygarlıkta, geçmişin kadim bilgeliğinin çoğuyla bağlantımızı kaybettik. Unuttuğumuz şeylerden biri, ayın doğal döngüsünün, doğanın birçok rutinini nasıl etkilediğidir. Bu özellikle parazitlerin davranışları için geçerlidir. Yaşam döngülerini ay döngüsüyle senkronize ettikleri biliniyor. Çocuğunuz belirli ay döngüsü günlerinde aşırı davranışlar sergileyebilir... özellikle dolunayda ve hatta bazen yeni ayda.

Bu nedenle, etkinliği en üst düzeye çıkarmak için, bu Parazit Protokolü özellikle ay döngüsüne göre zamanlanmıştır. Ek 10, sayfa 477, her ay 19 gün boyunca (0 ila 18 arasında numaralandırılmış) uygulanan Parazit Protokolünü gerçekleştirmek için günlere bakmanız için kolay bir referans sağlar; dolunaydan üç gün önce başlar ve azalan ay boyunca devam eder. Ay döngüsünün bu dönemi, haşarat giderme için çok etkilidir çünkü birçok nematod (parazit solucanlar) bu zamanda çiftleşmek için bağırsağa geri döner.

Tedavi Süresi

Bu protokol tek seferlik bir tedavi değildir. Birden fazla parazit yaşam döngüsünü temizlediğinizden emin olmak için en az 12 ila 18 ay arasında bir plan yapmalısınız ve çocuğunuz hala parazitleri atıyorsa 12 aydan sonra devam etmelisiniz.

CD'de oluşturma (MMS1, CDS, CDH)

Bu protokol, CD'yi kullanarak zaten öğrendiklerinizi temel alır. Tedavi süresince mutlaka CD dozlaması, CD banyoları ve CD lavmanlarına devam edilmelidir.

Bant Solucanları

Bu protokol özellikle kalın bağırsak parazitlerinin, özellikle Ascaris gibi yuvarlak nematodların solucanlarının giderilmesi için tasarlanmıştır. Çoğu nematod için etkilidir, ancak tenyalara karşı etkili olmayabilir. Taenias istilası durumunda önerilen tedavi, düşük toksisitesi nedeniyle tercih edilen ilaç olan Niclosamide'dir.

Kalcker Parazit Protokolünün Bileşenleri

Bu protokol, halihazırda öğrenmiş olduğunuz ve hâlihazırda yapıyor olmanız gereken şeylerin bir kısmını ve başlamadan önce elinizde bulundurmanız gereken bir dizi malzemeyi kullanır (aşağıda kalın harflerle gösterilmiştir). Burada, sahip olduğunuz öğelerin genel bir listesi bulunmaktadır.

Machine Translated by Google

elinizin altı nda olması gerekecek ve öğeler aşağı daki sayfalarda ayrı ntı lı olarak açı klanı yor:

• Yemek zamanı (1, 2, 3)

• CD / CDS (4-19) • CD

Banyoları (20) • CD

Lavmanları (21, 22) •

Okyanus Suyu (23, 24, 25) (bkz. sayfa 115) • Diyatomlu

Toprak (26, 27) • Lepidium Latifolium Özü

(Rompepiedras) veya

Chanca Piedra (Taş Kı rı cı) (28, 29) • Pyrantel

Pamoate (Combantrin®) (30, 31) • Mebendazol (32-36) • Hint

Yağı (37) • Neem (39, 40) • Probiyotik (genellikle THERALAC®)

(41)

Bu ürünleri nerede bulabileceğinizle ilgili en son bilgiler için aşağı daki web sitesini kontrol edin:

www.ProtocolSuppliers.com

Probiyotik için "(40)" gibi önceki öğelerin her birini takip eden parantez içinde bir veya daha fazla sayı fark etmiş olabilirsiniz. Neyin ne zaman verileceğinin zamanlaması , 198. sayfadan itibaren günlük çizelgelerde ayrı ntı lı olarak ele alı nmı ştı r. Bu sayı lar, noktaları birleştirmenizi ve ilgili notları belirlemenizi kolaylaştı rmak için günlük örnek çizelgelerde bulunanlarla eşleşir. her grafiğin altı nda. Herhangi bir maddenin miktarı /dozlaması ile ilgileri yoktur. Bu sayı ları n kullanı lması , günlük örnek çizelgelerde gösterildiği gibi, belirli öğeler ve bunları n ne zaman ve nerede devreye gireceği hakkı nda yorum yapmamı zı sağlar.

Şimdi yukarı daki listedeki her bir öğeyi detaylandı racağı z ve neyin ne olduğunu tartı şacağı z. onlar hakkı nda ve onları nası l edineceğiniz hakkı nda bilgi sahibi olmanı z gerekir (tablolardaki ilişkili sayı ları dahil).

Öğünler (1, 2, 3)

Açı ktı r ki, yemekler herkesin gününün bir parçası dı r. Bunlardan burada bahsetmemin amacı , aşağı daki adı mları n çoğunun yemek zamanlaması ile ilgili olması dı r. Bazı eylemler veya içerikler kahvaltı dan önce, diğerleri sı rası nda veya sonrası nda alı nı r.

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü

Örnek tabloları mı zda, aşağı dakileri içeren bazı varsayı mlarda bulunuyoruz:

• Kahvaltı (1) 07:30'da • Öğle Yemeği
(2) 12:00'de • Akşam Yemeği (3)
17:00'de

CD, CDS veya CDH (4-19)

Bölüm 5'te öğrendiğiniz gibi, Parazit Protokolü sı rası nda daha önce olduğu gibi CD (veya CDS/CDH) dozlamaya devam edersiniz. Zaten yürürlükte olan bu adı mları n üzerine inşa edilen Parazit Protokolü ile bu konuda hiçbir şey değişmez.

Örnek çizelgeler çocuğunuzun okula gideceğini varsayar ve bu nedenle, evde eğitim görmediğiniz sürece okul gününde (7-12) CD dozları uygulayamayabilirsiniz, bu durumda saatlik CD dozları vermeniz önerilir. , toplam gün için 8'i geçse bile.

CD Banyoları (Opsiyonel) (20)

Örnek çizelgelerimiz, yatmadan hemen önce bir CD banyosu uyguladı ğı nı zı varsayar.
CD banyoları hakkı nda daha fazla bilgi için sayfa 113'e bakı n.

CD Lavmanları (21, 22)

İdeal olarak, çocuğunuza sabah (21) ve akşam (22) bir CD lavmanı verin. Ancak, çocuğunuz okula gidiyorsa, bir "kaza" olası lı ğı nedeniyle sabah (21) lavmanı iyi bir fikir olmayabilir. Bu nedenle, sabah lavmanı nı isteğe bağlı olarak düşünün, ancak gece lavmanı nı mutlaka yapı n!
Daha fazla bilgi için sayfa 103'e bakı n.

Okyanus Suyu (23, 24, 25)

Okyanus suyu minerallerini desteklemek, vücudu detoksifikasyon sürecinde desteklemek için önemlidir. Okyanus suyu hakkı nda daha fazla bilgi için sayfa 115'e bakı n.

dozlama:

(23) Uyandı ktan sonra bir doz okyanus suyu verilmelidir, ancak CD dozundan beş dakika sonra verilmelidir.

(24) Okuldan hemen sonra (veya evdeyse öğle yemeği saatinde) bir doz okyanus suyu.

(25) Akşam yemeğinden 15 dakika önce veya sonra bir doz okyanus suyu.

Machine Translated by Google

Diyatomlu Toprak (DE) - Gı da Sı nı fı (26, 27)

Diyatomeler, 300 milyondan fazla okyanusları mı zda trilyonlarca var olan tek hücreli bitkilerdir. Yı llar önce. Silikadan yapı lmı ş bir hücre duvarı ile kaplı dı rlar. Diyatomlar öldüğünde, bu mikroskobik kaplama okyanusları n dibinde birikir. Üzerinde zamanla bankalarda birikerek binlerce metre büyüklüğünde birikintiler oluştururlar. İle okyanusları n çekilmesi, bu birikintiler ortaya çı karı lmı ştı r. Sı kı ştı rma ve nihayetinde fosilleşme yoluyla, bu silika birikintileri, diyatomlu toprak adı verilen bir tebeşir kayaya yol açmı ştı r.

DE, manganez, magnezyum, demir, titanyum, kalsiyum silikatlar ve diğerleri gibi bir dizi mineral içeren inert, toksik olmayan bir bileşiktir.
Düzgün bir şekilde öğütüldüğünde, mikroskobik diyatomları n iskeletleri, parazitler, mantarlar, mayalar, solucanlar ve amipler için zararlı olan keskin silis iğneleri haline gelir. Ancak bu iğneler insanlara ve diğer sı cakkanlı hayvanlara zararsı zdı r.

İki atomlu toprağı sürekli tüketmek güvenli olsa da en iyi yöntem (her şeyde olduğu gibi) dinlenme sürelerine izin vermektir. 18 günlük tedavi sı rası nda günde iki kez iki çay kaşı ğı (5ml) alı n.

Dozlama: Küçük çocuklar için günde iki kez ½ ila 1 çay kaşı ğı , yetişkinler ve daha büyük çocuklar için günde üç kez 1 çay kaşı ğı . Biraz su ile karı ştı rarak içilir. 1 ila 18. günlerde verilir. DE suyla iyi karı şı r ama asla çözünmez. DE/su bulamacı nı kuvvetlice karı ştı rı n ve DE dibe çökmeden hemen için. Bazı insanlar tepeleme yemek kaşı ğı su alı r, ancak daha büyük miktarlar gerekli değildir. Kuru almayı n!

Not: Nadir durumlarda, DE kabı zlı ğa neden olabilir ve bu genellikle dozları bir çay kaşı ğı nı n 1/2'sine, 1/4'üne ve hatta 1/8'ine düşürerek yönetilebilir. Bu sorunu çözmezse, DE'yi protokolden kaldı rı n ve diğer tüm yönergelerle devam edin.

Kaynak ve Maliyet: "Gı da Sı nı fı Diyatomlu Toprak" için çevrimiçi arama yapı n. En az 1 pound satı n alı n ve yaklaşı k 20 $ daha fazla veya daha az ödemeyi bekleyin. Daha da iyisi, pound başı na maliyetinizi azaltacak beş poundluk bir çanta satı n alı n. DE son kullanma tarihi geçmez veya bozulmaz, ancak kuru bir kapta saklanmalı dı r. Not: Diyatomlu Toprak

Machine Translated by Google

Adım 3 - Kalcker Parazit Protokolü genellikle havuz filtrasyon sistemlerinde toksik olmayan bir element olarak kullanılır. İşlendiği için bu tür bir DE kullanmak İSTEMEZSİNİZ. Sadece "Gıda Sınıfı" Diyatomlu Toprak alın!

Lepidium Latifolium Ekstresi (aka Rompepiedras veya Pepperwort) veya Chanca Piedra (namı diğer Taş Kıran) (28, 29)

Lepidium Latifolium (Rompepiedras) ve Chanca Piedra (Taş Kırıcı) vücuttaki sert maddeleri parçalar. Bu protokolde kullanmamızın iki nedeni var: Parazitlerin koruyucu dış kaplamasını parçalıyor ve oksalatlar parazitler tarafından üretildiği için çocukların mızın çoğunda bolca bulunan oksalatları yok ediyor.

Not 1: Tartışma forumlarımızda genellikle basitçe "RP" olarak anılır.

Not #2: Bu özel malzemeyi bulmakta zorlanıyorsanız, yokluğunun sizi diğer tüm malzemelerle protokole başlamaktan alıkoymasına izin vermeyin.

Dozaj: İki atomlu toprak/su ile karıştırılmış 100 kiloluk bir çocuk için 15 damla. Daha küçük çocuklar için yedi damla kullanın.

Kaynak ve Maliyet: İki bitki özü seçeneğiniz var; Lepidium Latifolium Özü (aka Rompepiedras veya Pepperwort) ve Chanca Piedra (aka Taş Kırıcı). Bir ABD kaynağı, 50 ml'lik damlalıklı Biberotu şişesini yaklaşık 30 dolara satan www.mightyguts.com'dur. Avrupa'daki birincil üreticilerden biri, ürünlerini Rompepiedras olarak etiketleyen İspanya'dan Soria Natural, aynı zamanda Pepperwort yazan İngilizce etiketli bir kutuya sahip. Her ikisi de kutuda Lepidium Latifolium gösteriyor.

Machine Translated by Google

Pirantel Pamoat (30, 31) (Trilombrin/Combantrin®)

Pyrantel pamoate, parazitleri uyarmadan veya göçlerini teşvik etmeden, parazitin spastik felcine ve ardı ndan bağı rsak peristaltik eylemiyle atı lması na neden olan bir nöromüsküler bloğa neden olarak çalı şan geniş spektrumlu bir antelmintiktir. Pyrantel pamoate kı sa sürede etki eder ve üç ila dört gün içinde dı şkı ve idrarla vücuttan tamamen atı lma eğilimindedir. Pirantel pamoat, gastrointestinal sistemden zayı f bir şekilde emilir ve toplamı n yaklaşı k %6 ila 8'i idrarda, geri kalanı ise dı şkı da bulunur. Önerilen doz, kilo başı na 10 mg'lı k günlük bir dozdur.

Pirantel pamoat, piperazin kullanı mı yla bağdaşmaz, çünkü iki madde birbirini nötralize eder. Bu nedenle Pyrantel pamoate, piperazin içeren kabak çekirdeği veya formülasyonunda piperazin içeren antiparaziter ilaçlar ile birleştirilmemelidir.

Dozlama: Pyrantel pamoate, parazit protokolünün bir döngüsü sı rası nda yalnı zca iki kez verilir; bir kez birinci gün kahvaltı sı rası nda (30) ve tekrar beşinci gün kahvaltı sı rası nda (31). Doz, ağı rlı ğa dayalı dı r ve çocuğunuzun ağı rlı ğı nı n kilogram cinsinden 10 mg pirantel pamoat ile çarpı lması yla hesaplanı r. Bunu kolaylaştı rmak için aşağı daki tabloya bakı n:

Pyrantel Pamoate (Trilobrin/Combantrin®) Ağı rlı ğa Göre Dozaj		
Sterlin	Kilogram Doz mg cinsinden.	
20	9	91
40	18	181
60	27	272
80	36	363
100	45	454
120	54	544
140	64	635
160	73	726
180	82	816
200	91	907
220	100	998
240	109	1089

Pyrantel pamoate (genellikle sadece Combantrin® olarak anı lı r) üç biçimde mevcuttur:

Machine Translated by Google

3. Adı m - Kalcker Parazit Protokolü • Sı vı : burada

her mililitre belirli sayı da miligram içerir. Örneğin, mevcut bir formülasyon 144 mg/ml içerir. Yani 100 lb'lik bir çocuk 3 ml alı rdı .

• Tabletler: her biri genellikle 250 mg içerir. • Kapsüller: her biri genellikle 250 mg içerir.

Aldı ğı nı z etiketi veya belirli ürünü okumanı z ve kullanı lacak miligramı belirlemeniz gerekecektir.

Kaynak: Combantrin® ABD'de reçeteyle satı lmaktadı r. Diğer birçok ülkede reçetesiz satı lmaktadı r.

Pirantel pamoatı n tercih edilen kaynağı , renklendirme ve tatlandı rmayı önlemek için bir bileşik eczanedir. Renklendirmeden/tatlandı rmadan bulamı yorsanı z, çocuğunuza gerilemeye neden olabilecek bir madde verme riskini almak yerine kişisel olarak 18 gün boyunca mebendazol kullanı rdı m.

Not 1: Bazı Combantrin® markaları mebendazol içerir. Bağı msı z Combantrin®'i istiyorsunuz!

Not: #2 Kabak çekirdeği etkilerini nötralize ettiği için pirantel pamoat ile tüketilmemelidir.

Mebendazol (Vermox®/Lomper®) (32-36)

Mebendazol, helmintlerin (gastrointestinal sistem parazitleri) neden olduğu hastalı kları n tedavisinde kullanı lan bir ilaçtı r. Bu ilaç parazitin glikozu kullanması nı engeller, bu da enerjinin düşmesine ve dolayı sı yla parazitin ölümüne neden olur.

Mebendazol, sistemik olmayan bir ilaçtı r, yani gastrointestinal sistemde yalnı zca sı nı rlı bir ölçüde (yaklaşı k %5 ila 10) emilir. Ancak yağlı besinlerle birlikte tüketilirse emilimi daha fazla olur.

Uygulanan mebendazolün yaklaşı k %2'si idrarla, kalanı ise feçesle atı lı r. Uygun mebendazol dozu, enfeksiyona neden olan parazitin tipine bağlı olarak her hasta için farklı olabilir.6 En sı k önerilen doz çocuklar için 100 mg, yetişkinler için 200 mg'dı r ve ilk dokuz günün yedisinde günde iki defadı r. Protokolün.

Mebendazolün yan etkileri, emiliminin zayı f olması nedeniyle genellikle nadirdir. Ancak mide bulantı sı , kusma, karı n ağrı sı ve ishale neden olabilir. Normal olarak bu etkiler aslı nda toksinlerin ölümden salı nması nı n bir sonucudur.

Machine Translated by Google

parazitin kendisi. Anti-paraziter ilaçlar, suda seyreltilerek, karı şı m küçük bir ampul lavmana konularak ve anal yoldan sokularak çok etkili bir şekilde uygulanabilir. Bu özellikle oksiüriazis (kı l kurdu) durumunda uygundur.

Bu "implant yöntemi" hakkı nda daha fazla bilgi için sayfa 220'ye bakı n.

dozlama:

Not: Belirtilen ağı rlı klar yalnı zca kaba bir kı lavuz olarak değerlendirilmelidir.

Küçük Çocuklar (20-40lbs.): 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9. Günler — Kahvaltı ve akşam yemeği ile 25 mg kadar az mebendazol alı n ve 9. Günde yı ldı rı m YAPMAYIN.

Çocuklar (41-70lbs.): 2, 3, 4, 6, 7 ve 8. Günler - kahvaltı ve akşam yemeği ile 50 mg. 9. günde 50mg, 50mg ve 25mg alabilirler.

Ergenler (71-100lbs.): 2, 3, 4, 6, 7 ve 8. Günler - kahvaltı da 100 mg ve akşam yemeğinde 100 mg. 9. Gün, kahvaltı sı rası nda 200 mg'lı k BİR doz uyguladı ğı nı z "Mebendazole Blitz Günü"dür; Öğle yemeğinde BİR 200 mg doz; ve akşam yemeğinde son bir 100 mg doz.

Gençler ve Yetişkinler (101 lbs. ve üstü): 2, 3, 4, 6, 7 ve 8. Günler - kahvaltı da 200 mg ve akşam yemeğinde 200 mg. 9. Gün, mevcut döngünün geri kalanı nda kahvaltı sı rası nda 500 mg'lı k BİR doz uyguladı ğı nı z ve öğle veya akşam yemeklerinde hiçbir doz uygulamadı ğı nı z "Mebendazole Blitz Günü"dür.

Kaynak: Mebendazol, ABD'de ve dünyanı n her yerinde reçeteyle satı lmaktadı r. diğer ülkelerde sayaç.

Not 1: Bazı markalar mebendazol ile Combantrin®'i birleştirir. Tek başı na mebendazol istiyorsun!

Not 2: Mebendazol çoğunlukla tablet şeklinde satı lı r, ancak sı vı halde de bulunur. Sı vı formu SATIN ALMAYIN - tabletlere bağlı kalı n! Sı vı ürünlerde kullanı lan "inert" araçlardan korkunç tepkiler gördüm.

Hint Yağı (37)

Hint yağı , Ricinus communis ("Higuera del diablo") adlı bir bitkinin tohumundan

çı karı lı r. Tohumları , mükemmel müshil ve müshil özelliklere sahip yüksek risinoleik asit içeriğine sahip% 50-80 arası nda yağ içerir.

Anti-parazitik tedavilere başladı ğı nı zda, bazı parazitlerde spastik felç meydana gelebilir ve birçoğu birlikte bağı rsak tı kanı klı ğı na neden olabilecek bir solucan "düğümü" oluşturabilir. Vücudunuza yardı m etmek ör

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü, bunları hint yağı kullanarak temizler. Hint yağı sabah kahvaltı dan iki saat sonra ve diğer ilaçlarla alı nmalı dı r. Çocuğunuz okula giderse, okuldan kapı dan girer girmez onu alı rlar. Bir çocuk için tipik bir doz, 1/2 çay kaşı ğı ila 1 çay kaşı ğı veya toleransa kadardı r. Yetişkin dozu, kahvaltı dan ve diğer ilaçlardan iki saat sonra 15 ila 30 ml'dir (iki yemek kaşı ğı). Herhangi bir bağı rsak rahatsı zlı ğı yaşarsanı z, Epsom tuzları gibi mineral temizleyiciler veya sinameki yaprakları gibi bitkisel temizleyiciler kullanı labilir.

Tadı nı sevmeyenler için hint yağı jelatinli olarak da mevcuttur.

Dozlama: Uygulanacak miktar değişir ve gerçekten kişinin toleransı na bağlı dı r. Küçük çocuklar için ½ çay kaşı ğı ve daha büyük çocuklar ve yetişkinler için en fazla iki yemek kaşı ğı iyi bir başlangı ç noktası dı r. Hint yağı ishale neden oluyorsa, doğru miktarı yalnı zca deneyler belirleyecektir.

Kaynak ve Maliyet: Müshil bölümünde çoğu eczanede sı vı formda kolayca bulunur. Genellikle 16 oz için 10 doları n altı nda. Ayrı ca çevrimiçi olarak da mevcuttur.

Neem (Azadirachta indica), Kepçe veya Çay (38, 39)

Neem ağacı , insanlı ğı n büyük bir doğal mirası dı r. Sanskritçe kutsal metinlerdeki ve ayurvik tı p uygulamaları ndaki referanslar, neem'in Hindu tı bbı nda eski zamanlardan beri kullanı ldı ğı nı göstermektedir. Bugün bile, kı rsal alanlarda yaşayan Hindular, birçok hastalı ğı hafifletme kabiliyeti nedeniyle neem ağacı nı "köy eczanesi" olarak adlandı rı yor ve şu anda Hindistan'daki yetkililer tarafı ndan tı bbi müstahzarlarda kullanı lması onaylanı yor. Neem, arı ndı rı cı ve detoksifiye edici bitkilerden

Machine Translated by Google

En büyük

potansiyele sahip Bölüm 8 . Neem, hem dı ş hem de iç parazitler gibi her türlü vücut parazitiyle savaşmak için kullanı lmı ştı r. Neem hazı rlamak için dört yaprağı (normalde bir zarfı n içindekiler) bir litre suda beş dakika kaynatı n. Her parazit protokolü boyunca gün boyunca çayı için.

Dozlama: Neem'e her parazit protokolü 10. günden 18. güne kadar verilir.

Caps veya çay seçenekleriniz var. Çay yerine kapak tercih ederim çünkü tadı güçlü ve nahoştur, bu nedenle bazı çocuklar çay içmeye bayı lı r.

Kapaklar (her biri 475 mg olduğu varsayı larak): Bir yetişkin günde altı , yemek zamanları nda üç kez iki kapak alı r.

Şişedeki talimatları izleyin. Gençler ve yetişkinler için tam doz verin 100 pound ve bitti. Küçük çocuklara ¼ ila ½ doz verilir.

Kapak kullanı yorsanı z, kahvaltı da bir doz ve akşam yemeğinde bir doz verin.

Çay: Gün boyunca dört doz verin. Yapraklardan bir çay, bir litre suya bir çay poşeti hazı rlayı n (acı tadı n bir kı smı nı kapatmak için gerekirse stevia ekleyin). Bir çay poşeti genellikle yaklaşı k dört yaprak içerir. Gevşek yapraklar kullanı yorsanı z, dört neem yaprağı ile bir litre çay yapı n. Ezilmiş yapraklar kullanı lı yorsa, yaklaşı k bir hafif tepeleme çay kaşı ğı kullanı n.

Neem Çay Dozu	
Kişinin Ağı rlı ğı	Toplam Günlük Tutar (4 doza bölünecek)
20-34 pound	100 mi
35-49 pound	200 mi
50-64	300 mi
65-84	400 mi
85-109	500 mi
110 ve üstü	600 mi

Machine Translated by Google

3. Adı m - Kalcker Parazit Protokolü Kaynak ve Maliyet:

Neem kapsülleri, 100x 475mg'lik kapaklar için yaklaşı k 8$'dı r. Yerel sağlı klı gı da mağazanı za bakı n. ABD'deki popüler markalardan biri Nature's Way®'dir. BioPureTM, Neem'i etkilemeyen birkaç ek bitki içeren Neem Synergy adlı bir ürün satmaktadı r .

Neem çayı torbalarda veya kurutulmuş yapraklar olarak satı n alı nabilir.

THERALAC® (Probiyotik) (40)

THERALAC®, iyi bağı rsak florası nı n yeniden kurulması na yardı mcı olmak için parazit protokolü sı rası nda verilmesi gereken bir probiyotiktir. İdeal olarak, THERALAC® TruFlora® ile iki ayda bir dönüşümlüdür .

THERALAC®'ı diğer probiyotiklere tercih etmenin temel nedeni, web sitelerinden alı ntı lanan bu paragrafta açı klanmaktadı r:

> THERALAC® probiyotikler, midenin sert asiditesinden geçerek hayatta kalı r ve canlı olarak bağı rsak yoluna ulaşı r. THERALAC'ı n ACID PROOF™ teknolojisi, normalde yaşanan en şiddetli mide asidi koşulları olan 90 dakika boyunca pH 1,6'da hayatta kalmayı garanti eden benzersiz bir formülasyonda deniz yosunundan sodyum aljinat kullanı r. Asit direnci iddia eden diğer probiyotikler, pH 2,5 – 3,0 veya pH 1,6'dan > 10 kat daha az asidik olarak test edilir - bu adil bir test değildir. THERALAC'ı n ACID PROOF® teknolojisi, ABD Patentleri 7,122,370 ve 7,229,818 ile korunmaktadı r. Bu teknoloji, mide asidine direnmenin ötesine geçiyor ve probiyotik hücreleri, diğer probiyotikler gibi ayrı ayrı hücreler olarak değil, bağı rsak yolunun derinliklerinde temel formül bileşenleri LactoStim® ve Sodyum'u korurken, grup gücünde hareket eden viskoz bir aljinat jelinde bir arada tutmayı içeriyor. Yakı n çevrede aljinat.

Dozlama: Yaş/kilodan bağı msı z olarak her gece yatmadan önce bir THERALAC® kapsülü verilir. Bu probiyotik ayrı ca 19 Parazit Protokol günü dı şı nda da verilmelidir.

Çocuğunuz kapsülleri yutarsa THERALAC® CD ile aynı anda verilebilir. Ancak THERALAC® toz formunu kullanı yorsanı z, gecenin son CD dozundan en az beş ila on dakika sonra verin. Toz formu hakkı nda daha fazla bilgi için web sitelerine bakı n.

Özel istisna: Bazı insanlar probiyotiklere tolerans göstermezler, bu durumda onları dı şarı da bı rakmaktan başka çaremiz yoktur. Bu vakaları n bazı ları nda, lahana turşusu ve fermente edilmiş sebzeler faydalı bakterilerin geliştirilmesine yardı mcı olabilir.

Kaynak ve Maliyet: Amazon'da " Master Supplements Inc.'den THERALAC® 30 kapak" bulunur. 37 dolar için.

Machine Translated by Google

Örnek Parazit Protokolü Günlük Takvimi

Parazit Protokolünü ve günden güne nası l değiştiğini anlamanı za yardı mcı olmak için, tüm parçaları n nası l bir araya geldiğini gösteren aşağı daki görsel günlük çizelgeleri hazı rladı k. Bu tablo setini hazı rlamak için, yalnı zca örnek olması amacı yla aşağı daki saatleri oluşturduk:

- Çocuğunuzun uyanı k olduğu saat 06:00 ile 22:00 arası ndadı r.
- Kahvaltı 07:30'da
- Çocuğunuz sabah 9'da başlayan okula gidiyor
- Okul 14.30'da çı kı yor
- Akşam yemeği 17.00'de

Daha önce belirtildiği gibi, her doz veya aktivite benzersiz bir numara ile etiketlenmiştir. Bu sayı lar, her grafiğin altı ndaki notlarla ilgilidir VE önceki sayfalardaki daha uzun açı klayı cı notlarla eşleşir.

Ek 9'daki (sayfa 475) boş tabloyu kopyalamanı z/büyütmeniz ve bu örnek tablolara dayalı olarak gerçek hayattaki programı nı zı yapmanı z önerilir.

Dolunay ve yeni ay çevresindeki parazitlerle ilgili davranı şlar hakkı nda bir fikir edinmenin yanı sı ra, protokolün tam olarak izlenmesi gereken günler için ay takvimine (Ek 10, sayfa 477) bakı n.



Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü



0. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google



1. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman. CD'den en az 5
23 - 25	dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
30	Kahvaltı da Combantrin dozu
* 37	Kahvaltı dan 1 saat sonra veya okuldan döner dönmez hint yağı .
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü



2. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman. CD'den en az 5 dakika
23 - 25	uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
32, 33	Küçük Çocuk Dozu: Kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte 100 mg Mebendazol. Genç/Yetişkin Dozu: Kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte 200mg Mebendazol.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google



3. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
32, 33	Küçük Çocuk Dozu: Kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte 100 mg Mebendazol. Genç/Yetişkin Dozu: Kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte 200mg Mebendazol.
* 37	Kahvaltı dan 1 saat sonra veya okuldan döner dönmez hint yağı .
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü



4. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
32, 33	Küçük Çocuk Dozu: Kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte 100 mg Mebendazol. Genç/Yetişkin Dozu: Kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte 200mg Mebendazol.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google



5. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman. CD'den en az 5
23 - 25	dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
31	Kahvaltı da Combantrin dozu (bugün Mebendazole YOK!)
* 37	Kahvaltı dan 1 saat sonra veya okuldan döner dönmez hint yağı .
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü



6. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman. CD'den en az 5 dakika
23 - 25	uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
32, 33	Küçük Çocuk Dozu: Kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte 100 mg Mebendazol. Genç/Yetişkin Dozu: Kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte 200mg Mebendazol.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google



7. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
32, 33	Küçük Çocuk Dozu: Kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte 100 mg Mebendazol. Genç/Yetişkin Dozu: Kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte 200mg Mebendazol.
* 37	Kahvaltı dan 1 saat sonra veya okuldan döner dönmez hint yağı .
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü



8. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
32, 33	Küçük Çocuk Dozu: Kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte 100 mg Mebendazol. Genç/Yetişkin Dozu: Kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte 200mg Mebendazol.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google



9. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman. CD'den en az 5 dakika
23 - 25	uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
34	Blitz Günü - Küçük Çocuk Dozu 1: Kahvaltı yla birlikte 200 mg Mebendazol. Genç/Yetişkin Dozu: 500mg Mebendazol YALNIZCA kahvaltı ile birlikte!
35	Blitz Günü - 2. Doz: Öğle yemeğiyle birlikte (veya okuldan hemen sonra) 200 mg Mebendazol Genç/Yetişkin Dozu: Yok
36	Blitz Günü - 3. Doz: Akşam yemeğiyle birlikte 100mg Mebendazol. Genç/Yetişkin Dozu: Yok
* 37	Kahvaltı dan 1 saat sonra veya okuldan döner dönmez hint yağı .
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü



10. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
38, 39	Neem Caps'i kahvaltı ve akşam yemeği ile dozlamaya başlayı n. Çay kullanı yorsanı z, gün boyunca 4 doz.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google



11. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
38, 39	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Neem Caps. Çay kullanı yorsanı z, gün boyunca 4 doz.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü



12. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
* 37	Kahvaltı dan 1 saat sonra veya okuldan döner dönmez hint yağı .
38, 39	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Neem Caps. Çay kullanı yorsanı z, gün boyunca 4 doz.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google



13. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
38, 39	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Neem Caps. Çay kullanı yorsanı z, gün boyunca 4 doz.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü



14. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
38, 39	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Neem Caps. Çay kullanı yorsanı z, gün boyunca 4 doz.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google



15. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
* 37	Kahvaltı dan 1 saat sonra veya okuldan döner dönmez hint yağı .
38, 39	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Neem Caps. Çay kullanı yorsanı z, gün boyunca 4 doz.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google



16. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
38, 39	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Neem Caps. Çay kullanı yorsanı z, gün boyunca 4 doz.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google



17. Gün - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
38, 39	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Neem Caps. Çay kullanı yorsanı z, gün boyunca 4 doz.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü



18. Gün (Son Gün!) - Notlar:	
1, 2, 3	Kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği
4 - 19	Gün boyunca en az 8 CD dozu, tercihen daha fazla, yemeklerden en az 30 ila 60 dakika uzakta.
20	Günün sonunda CD Banyosu.
21, 22	Sabah (isteğe bağlı) ve akşam (zorunlu) lavman.
23 - 25	CD'den en az 5 dakika uzaklı kta 3 doz okyanus suyu.
26 - 29	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Diyatomlu Toprak ve Lepidium Latifolium.
* 37	Kahvaltı dan 1 saat sonra veya okuldan döner dönmez hint yağı .
38, 39	Kahvaltı ve akşam yemeği ile Neem Caps. Çay kullanı yorsanı z, gün boyunca 4 doz.
40	Günün sonunda probiyotik

Machine Translated by Google

Parazit Protokolü Kapalı Günleri

"19"dan bir sonraki "0. Güne" kadar olan günler, parazit ilaçları ve şifalı otları bı raktı ğı nı z "Boş Günler"dir. İşte bu boş zaman sı rası nda neleri yapmaya devam edeceğinizi ve neleri durduracağı nı zı gösteren basit bir tablo :

Bunlarla devam edin:
CD / CDS / CDH Dozlaması
CD / CDS / CDH Banyoları
CD / CDS / CDH Lavmanları
Okyanus suyu
probiyotik

Bunları durdurun:
Silisli toprak
Lepidyum Latifolium
Pirantel Pamoat (Combantrin®)
mebendazol
Almak
Hint Yağı

Elbette bu varsayı msal bir durumu temsil eder ve durumunuz başka ilaçlar veya takviyeler almayı gerektirebilir.

Dı şkı da Parazit Tespiti

Dı şkı yı dikkatlice gözlemleyerek parazitleri tespit etmek gerekir. Bunun için küçük bir plastik leğen ve inceleme için plastik bir çubuk veya çatal kullanı yoruz.

Yazarı n Notu: Forumumuzun bir parçası olan annelerden biri, parazit teşhisi için çocuğunuzun dı şkı sı nı işlemek için bazı yönergeler buldu.
Buna "Kakayı Sı ralama Hakkı nda Bilmek İstediğiniz Her Şey" diyor.
İşte onun önerileri:

Tedarik:

- lastik eldivenler
- kağı t tabaklar
- plastik çatallar (plastik çubuklar, kesme çubukları veya plastik sı rt kaşı yı cı)
- bir kalem
- madeni para • tuvalet şapkası

Numune toplayı cı veya numune toplama ünitesi olarak da bilinen, klozetin altı na giren ve dı şkı yı tuvaletin dibine batmadan önce toplayan plastik bir "tuvalet şapkası " kullanmayı seviyorum (Amazon.com'da mevcuttur).

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü



Koleksiyon:

Çocuğunuz kakası nı yaptı ğı nda tuvalet şapkası nda toplanı r (numune toplayı cı). Çocuğumu temizledikten ve baktı ktan sonra, klozetten klozet şapkası nı çı karı rı m ve örneği plastik çatalı mla bir kağı t tabağa koyarı m. İlginç bir şey arı yorum ve sonra güvenilir plastik çatalı mı kullanarak o kı smı temiz bir tabağa aktarı yorum. Numunenin geri kalanı nı tuvalete atı yorum, sifonu çekiyorum ve o kirli kağı t tabağı banyo çöpüne atı yorum. (Artı k mutfak çöp torbaları nı sı ralı yoruz ve her kakadan sonra değiştiriyorum.) Şüpheli solucanı n bulunduğu temiz tabağa biraz su ekleyebilir ve solucan temizleyicisini elde etmek için çalkalayabilirim. Daha sonra net bir görüntü elde etmek için solucanı üçüncü bir plastik plakaya aktarabilirim. Yı kanmı ş solucanı n olduğu temiz plakanı n üzerine tarihi ve solucanı n geldiği kişinin baş harflerini yazı yorum. Solucanı tanı mlamak için yardı ma ihtiyacı nı z varsa, solucanı n yanı na bir kuruş koyun (boyut bağlamı için), bir resim çekin ve resmi kerri@cdautism.org adresine postalayı n (Kerri fotoğrafları dokümantasyon amacı yla toplar, bu yüzden o solucan resimlerini gönderin)). Ardı ndan solucanı yı kayı n ve tüm kağı t tabakları , eldivenleri ve çatalları çöp kutusuna koyun ve dı şarı çı karı n. Artı k siz tüm bunları yaparken çocuğunuzun nelere bulaştı ğı nı gidip öğrenebilirsiniz.

Temizlemek:

SICAK su (60°C/140°F) kullanı n ve %96 (180 derecelik) tahı l alkolü (Everclear) ile sterilize edin.

Machine Translated by Google

Mikroskop

Mikroskop hem kanda görülebilecek küçük parazitleri hem de dı şkı daki yumurta veya larvaları görmenizi sağladı ğı için tanı için çok faydalı dı r. Bu şekilde parazit sayı sı nı n azalı p azalmadı ğı nı daha doğru tespit edebiliyoruz. Yaklaşı k 100 dolara mal olan basit bir mikroskop bu tür bir tanı mlama için uygundur. Ne gördüğünüzü belirlemenin en kolay yöntemi, örneğinizi Google'da bulduğunuz resimlerle karşı laştı rmaktı r. Bu şekilde görüntüleri büyütebilir, çeşitli örnekleri farklı açı lardan görebilir ve bir örneği birçok ders kitabı yla karşı laştı rı yor olmanı zdan çok daha geniş bir örnek çeşitliliği elde edebilirsiniz.

Ampul Lavmanları ("İmplant" olarak da bilinir)

Kı l kurtları ndan, gece uyanmaları ndan vb. kaynaklanan anal kaşı ntı yı önlemek için, küçük çocuklar için 10 ila 15 ml suda 50 mg mebendazol veya 15 ila 20 ml suda 100 mg mebendazol seyreltilmiş ampul lavman veya küçük kateter/ şı rı nga kullanabilirsiniz. daha büyük çocuklar/gençler/yetişkinler için su. Bunu yapmanı n en iyi yolu, ilacı yatmadan hemen önce rektumdaki su ile birlikte vermek ve gece boyunca tutmaktı r. "İmplant" kullanı yorsanı z sabah lavmanı zorunludur.

Machine Translated by Google

Adı m 3 - Kalcker Parazit Protokolü
Solucan Fı sı ldayan

Aşağı daki bilgelik sözleri, Solucan Fı sı ldayan takma adı nı kazanan bir anneden (parazitleri yok etme yeteneği Solucan Ninjası nı daha uygun hale getirse de). Bağlı lı ğı ve çalı şkanlı ğı , yalnı zca oğlunun değil, "aşı rı vakalar" dediği sayı sı z başka çocuğun hayatı nda da fark yarattı . Burada sunulan bilgiler, ailesiyle yaşayan daha büyük/saldı rgan bir çocuk ile ailesinin artı k onlara sağlayamadı ğı bakı m için bir grup evine gitmesi arası ndaki fark olabilir. Öncü olduğun ve asla pes etmediğin için teşekkürler Robin. Öğrendiklerinizi ona en çok ihtiyaç duyanlarla paylaşma cesaretine, bilgi birikimine ve cömertliğine sahip olduğunuz için teşekkür ederiz.

Ekstrem Vakalar, Robin Goffe

Bu bölüm şiddetli, kendine zarar verebilecek, yı kı cı , fiziksel olarak saldı rgan, yüksek riskli ve/veya yatalak olabilecek daha büyük çocuklar içindir.

Bazı ailelerin tedaviye ilk başladı kları nda daha büyük çocukları vardı r. Oğlum 18 yaşı ndaydı . Kendimize "son şans" grubu diyoruz. Bunu söylüyoruz çünkü çocukları mı z bizim haberimiz olmadan tüm hayatları nı istila edilmiş olarak yaşadı lar. Çocukları mı z mutlu, görece kolay yönetilebilir, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar olarak yaşadı lar: film diyaloğu komut dosyası yazma rutinleri veya Disney filmlerine, haritalara veya az bilinen gerçeklere bağlı lı kları yla belki biraz can sı kı cı ydı lar. Çoğunlukla arkadaşsı zdı lar ama ilgilenmeleri oldukça kolaydı . Bununla birlikte, hormonal gençlik yı lları nda işler ciddi bir hal aldı . Yeni keşfedilen yalnı zlı kları nı , arkadaş eksikliği nedeniyle sosyal olarak pes etmeye tebeşirlemiş olabiliriz. Uymadı lar. Başka bir şeyin demlendiğine dair hiçbir fikrimiz yoktu. İçlerindeki hormonlar, içlerinde yaşayan parazitlerle kı yası ya bir savaş vermeye başlar ve yakı nda bir savaş patlak verir. Zihinsel durumları önemli ölçüde azalı r.
Karşı karşı ya olduğumuz yetişkin, güçlü, akı l hastası ve şiddet yanlı sı , kendine zarar veren ve yı kı cı çocuklardı r. Hatta bazı ları o kadar hastalandı ki yatakta kalmak zorunda kaldı lar.

Bu "son şans", onları bir grup evine koymadan önce BİR ŞEY DAHA denemek için bir fı rsattı r; onları vermek - kendi güvenlikleri ve ailelerinin güvenliği için.

Sizinle paylaşacağı m bu şeyler, kitapta özetlenen standart tedaviye özgüdür. Gerekli olduğu için daha agresif bir tedavidir. Çocukları mı z o kadar çok istila edildi ki, size ne bulduğumuzu anlatmak şok edici. Yapı lacak çok şey var ama bir yöntem var. Vakit geldi

Machine Translated by Google

Goffe ailesi.

tüketen ve çok iş var. Ama burada, oğlumuzu saldı rgan, kendine zarar veren, yı kı cı bir genç adamdan sabrı , dili, anlayı şı ve muhakemesini yeniden kazanmı ş biri haline getirmek için neler yaptı ğı mı zı özetleyeceğim; ama en güzeli evimizde kalma fı rsatı . Devam eden tedavilerle, bir gelecek için ümidi var: belki bir iş ve hatta belki de kendi ailesi.

Daha büyük olan ve özellikle saldı rgan, kendine zarar veren, şiddet yanlı sı ve yı kı cı olan çocuk için tedaviye başlamak, yavaş ve yavaş başlanan bir tedavidir.

Birinci gün = bir damla.

Çok ayrı ntı lı bir günlük tuttum ve size ne yaptı ğı mı zı basitçe anlatacağı m. Size bizim için neyin işe yarayı p neyin yaramadı ğı nı anlatacağı m. Başkaları yla paylaştı ğı m ve onlar için de işe yarayan şeyleri de size anlatacağı m. Ben doktor değilim. Ben bir kimyager değilim. Oğluma aşı k bir anneyim ve onun son derece rahat olması benim ası l endişemdi. Tek amacı m parazitlerini temizlemekti. 9 ay boyunca onun taburesini eşeleyerek öğrendiklerimin sonunda bana "Solucan Fı sı ldayan" lakabı nı vereceği hakkı nda hiçbir fikrim yoktu. Bağı rsak parazitleri, insandan daha uzun süredir var olmaları na ve bir insanı n içinde ömür boyu yaşayacak kadar akı llı olmaları na rağmen, tamamen fark edilmeden gidebilirler. Onlara karşı bir savaş planlamaya hazı rdı m. 9. aylı k tedavimizin başlangı cı nda, 35 pound (16 KG) katı paraziti temizlediğimi ve incelediğimi tahmin ediyorum. İnanması zor? Bunları n %80'ini fotoğrafladı m. Son iki ayda

Machine Translated by Google

toplam yedi pound'dur ve bu kitabı n bası ldı ğı tarihte toplam uzunluğu 200 fitin (61 metre) üzerinde olacaktı r. Dünyada lateks eldivenler ve hastane maskesiyle her gün banyomda öğrendiklerimi öğretebilecek bir sı nı f yok. Kokuyu kontrol altı na almak için üzerime bir vantilatör üfledi ve üçüncü haftada öğürme refleksim kontrol altı na alı ndı .

Parazitleri, parçaları inceledim, nası l öldü? Oğlum o sı rada ne hissediyordu? Şiddetli miydi? Terlemek? Etrafta dolaşan parazitlerin acı sı ndan bacakları nı tokatlamak ve ona içeriden işkence etmek mi? Bu solucanları , öldürülürken oğlumun acı çekmesine izin vermeden ortadan kaldı rmam gerekiyordu. Karşı laşacağı m canavarlar hakkı nda hiçbir fikrim yoktu.

2013 yı lı nı n Mart ayı nda oğlumuza bir damla klor dioksit vermeye başladı k. Yetişkin büyüklüğündeki çocukları n ebeveynlerinin karşı laştı ğı en korkulan şeylerden biri, korkulan lavmandı r. Bu, çoğumuzun standart bakı m olarak büyüdüğü bir şey değil. Ama yine de, kocam ve ben bunun mantı klı bir şey olduğunu biliyorduk. Bu çocukları n içinde toksinler var. Yı kanmaları gerekir. Bağı rsak çı kı ş yoludur. Bu yüzden ilk gün ve ilk damlada, ileri derecede otistik çocuğumuza karnı nı daha iyi hissetmesine yardı mcı olacağı mı zı da anlattı k. Oğlumuz bu zamana kadar o kadar şiddetli bir gerileme içindeydi ki, onu ancak insan olmayan olarak açı klayabilirim. Artı k konuşmuyordu, bize tepki gösteremiyor, ismine cevap vermeyi bı rakmı ştı ve artı k ağzı ndaki salyayı tutamadı . Ağzı ndan sarkan 12 inçlik bir salyayla yürüdü. Bize ters ters bakarak bir hayvan gibi yedi. Sı k sı k şiddetliydi: arabaları n üzerine atlamak ve onları ezmek, çitleri tekmelemek ve mülke zarar vermek.

Bu, lavman vermeye başlayacağı mı z çocuktu. Biz yapabildiysek, herkes yapabilir.

Her gün bir damla yukarı çı ktı k; ikinci günde iki damla, üçüncü günde üç damla vb. Sinirli ve yorgundu. Saldı rganlı ğı yla başa çı kmak için her zamanki gibi yürüyüşe çı ktı k, ancak yedinci günde burnu akmaya başladı ve çok fazla yoruldu. Bunun aranacak bir işaret olduğunu bildiğimiz için çok mutluyduk; Bağı şı klı k sisteminin devreye girdiğini. Onu uyandı rdı ğı mı zda ve saatte bir doz verdiğimizde yaklaşı k 15 saat uyudu ve ertesi sabah dı şkı sı nda yaklaşı k 25 beyaz, kı llı , ince görünümlü nesne vardı . Bunları n solucan olduğunu ve cevabı mı zı aldı ğı mı zı biliyorduk. Üç hafta sonra her şekil ve boyutta 4-6 inçlik parazitler görmeye başladı k, ancak saldı rganlı k devam etti. Yaşadı ğı mı z şeyin POWS (Pissed Off Worm Syndrome) olduğunu burada öğrendim. Bu noktada 13 damladaydı k ve daha küçük parazitleri öldürürken sadece daha büyük olanları kı zdı rı yorduk.
Parazitler çevrelerinin rahatsı z edilmesini sevmezler ve daha sonra

Machine Translated by Google

sahibine sı kı ntı veriyor. Parazitler amonyak (muhtemelen hiperamonyemiye ve muhtemelen nöbetlere yol açar), morfin ve meth benzeri bir madde salgı lar. Bu toksinler vücuda girerken saldı rganlı k ve öfkeye de neden olabilirler. Bu öfke nöbetleri sı rası nda birçok eşyamı z kı rı ldı . Maddi nesnelere değer vermeyi bı raktı k.

Bize burada çift dozlama söylendi. Bu nedenle, oğlumuz saatte yaklaşı k iki damla eşdeğeri alı yor olsa da, artan saldı rganlı k, OKB veya kendine zarar verme davranı şı görürsek ona dört damla verirdik (çift dozlamanı n açı klaması için bkz. sayfa 103). Sakinleşmezse dört damla daha verdik. Bu, parazitler için mükemmel bir karşı lı k saldı rı sı ydı .
Birkaç dakika içinde saldı rganlı k yatı ştı . Kı rmı zı yüzü ve vahşi gözleri azaldı ve bir engeli daha aştı k.

Çift doz yöntemini onlarca kez kullandı k.

takip eden aylarda ve bu, parazitlerin neden olduğu saldı rganlı ğı n azaltı lması na büyük ölçüde yardı mcı oldu.

Tedavinin üçüncü haftası nda, gece boyunca oğlumuzun doz almayacağı zamandan endişe duyduk. Bu nedenle, sonraki altı ay boyunca ailemizin bir dozlama programı vardı , ek olarak gece yarı sı , sabah 2, 4'te dozlama ve sabah 6'dan akşam 22'ye kadar saatlik dozlara kadar geri alma. Bu programı sadece kocam ve ben değil, aynı zamanda hepimiz uykusuzluktan dönerken alarmları nı kurup sı raları nı alan oğlumuzun kardeşleri de paylaştı k.

İkinci ayda oğlumuzun davranı şları nı n sadece dolunayda değil, yeni ayda da değiştiğini gördük. Standart protokol, dolunay boyunca mebendazol kullanı r. Bununla birlikte, daha büyük, daha agresif çocuklarda mebendazolü yeni ay döngüsüne dahil ederek başarı lı olduk. Bu mini mebendazol kursları , her birinden dört gün önce başlayan yeni ve dolunaylar boyunca her biri 5-6 günlük daha kı sa patlamalar içerir. Ayrı ca, istila daha fazla olduğu ve parazit hareketi daha erken gerçekleştiği ve davranı şlara daha erken neden olduğu için, küçük çocuklara göre ay evresinde daha erken başlamayı gerekli gördük.

Saldı rganlı ğı olan bir çocuk için, her ebeveyn davranı şı n parazitle ilgili olduğunu hatı rlamalı dı r. Tedavi sı rası nda, çevrelerini, yani ev sahibini kontrol etmeye çalı şan parazitlerden kaynaklanan çeşitli davranı şlar göreceksiniz. Doz sı klı ğı nı artı rmanı n şiddeti ve saldı rganlı ğı azalttı ğı nı bulduk. Öfke içinde kaybolan çocuğunuza güvenmek zor olabilir. Aldatı lmı ş ve incinmiş hissediyorsun. Bunlar bizim de sı k duyguları mı zdı .
Geçiyor. Öfkelerin geçmesi yaklaşı k 4-5 ay sürdü. oldular

Machine Translated by Google

tuvalette bile parazitleri kovmaya çalı şı rken oluyordu. Bir planı n olsun. Müzik bizim için çok iyi çalı ştı . Kitap okumak da öyleydi.
Dikkatinizi dağı tacak bir şey bulun ve her zaman yatı ştı rı cı , rahatlatı cı tonlar verin. Oğlumuza onu ne kadar çok sevdiğimizi sı k sı k söylüyor, başı nı ve sı rtı nı ovuşturuyorduk. CDH adı verilen yeni bir CD hazı rlama yöntemi kullanı larak bu herxing davranı şları ndan kaçı nı labilir (CDH hakkı nda daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 7, sayfa 155).

CDH: Bu yeni hazı rlı k yöntemi, damlalarda daha yükseğe çı kması gereken daha büyük çocuklar için gerçekten çok büyük bir varlı k oldu. Yaklaşı k 20 damlada, normal CD'nin hacmi tatsı z hale geldi ve bazı çocukları n midesini bulandı rdı . Oğlum onlardan biriydi. CDH hazı rlı ğı yla, daha büyük, sert çocukları n daha büyük parazitleri kovmaya başlamak için gereken uygun seviyelere ulaşmada daha başarı lı olacağı na kesinlikle inanı yorum. Saldı rganlı k, şiddet, kendine zarar verme ve yı kı m gibi nöbet geçirmemiş büyük çocukları n çoğunda ihtiyaç duyulan miktarı n günlük 75-100 ml CDH arası nda olması kişisel inancı mdı r.
Bu miktarı n, beyaz kan hücrelerindeki mitokondrilere yalnı zca parazitleri değil, aynı zamanda bakterileri de yok etme gücü vermesi için gereken voltajla bir bağlantı sı olabilir. İş iki yönlüdür ve parazit öldükten sonra bakteriler onları hemen yutmak istediğinden hı zlı bir şekilde yapı lmalı dı r. Bunları söylüyorum çünkü parazitlerin durumunu her gün gördüm. Paraziti en az rahatsı zlı k vererek veya parazit tarafı ndan hazı rlı klı olarak öldürebilirsem, o zaman karşı koymaları ve herxing'e neden olmaları için zaman kalmadı ğı nı buldum. Bakteriler de devreye giriyor ve mücadele edilmesi gerekiyor. Daha yüksek miktarlarda CDH, oğlumun yüzünde bir kaş çatma veya endişe olmadan her ikisini de öldürür.

Stevia: CDH'ye tatlandı rı cı stevia ekleyerek sürecin daha keyifli olabileceğini ve dozun özelliklerini veya etkinliğini etkilemediğini buldum. Lamotte ClO2 test şeritleri tarafı ndan kanı tlanmı ştı r (test şeritlerinin kullanı mı hakkı nda bilgi için bkz. sayfa 467).

Nemlendirici: İlk aylarda istila seviyesi o kadar yüksektir ki, parazitlerin iradesini kı rmaya başlamak için gecelik dozlardan fedakarlı k edilmesi gerekebilir. Bu onları her gün görmekle ilgili değil, yavaş ve tutarlı bir şekilde iradelerini kı rmakla ilgili. CDH'nin sürekli agresif tahrişi parazitleri öldürecek ve kazanç elde etmelerini engelleyecektir. Gece tedavilerinin başka bir katmanı daha vardı r ve bu nemlendiricidir. Bir galon su tutan soğuk bir hava nemlendiricisini dolduruyoruz ve 35 damla aktifleştirilmiş CD (CDH DEĞİL) koyuyoruz ve bütün gece oğlumuzun başı nı n yanı nda akı tı yoruz. Bu da parazitleri maksimum düzeyde yok etmek için kullandı ğı mı z bir yöntemdi.

Machine Translated by Google

Baharatlar ve Otlar: Vücutları nı parazitlerden ve patojenlerden arı ndı rmak için daha büyük çocukları mı zla sürekli çalı şmamı z acildir. Hapları kolayca yutabilen çocuklar için boş jel kapsülleri bu bölümde Diğer Şifalı Bitkiler (sayfa 231) başlı ğı altı nda önerilen otlar ve baharatlarla doldurmanı n yararlı olduğunu bulduk. Jelkapları orada belirtilen çeşitlerle doldurarak harika sonuçlar bulduk: kara ceviz, zencefil, sedef otu, pelin ve civanperçemi ve parazitlere zehirli bir şölen olarak her öğünde iki ila dört farklı tane vererek.

Seçiminizi burada belirtilenlerle sı nı rlandı rmayı n, hepsini alı n. Plan veya kalı p yoktur. Herhangi bir kombinasyonu kullanı n.

Kolonikler: Profesyonel koloniler, daha büyük çocukları mı zdaki parazitleri iyileştirmeye ve temizlemeye önemli bir katkı olmuştur. Bunlara oğlumuz rutin lavmanlara alı ştı ktan birkaç ay sonra başladı k. Bu harika oldu

ek olarak ve haftada en az bir tane yapmaya çalı şı yoruz. Bazı yerler ekleme yapmanı za izin verir ve CDH'mizi orada 50-100ml CDH'ye kadar çalı şarak büyük bir başarı yla aldı k.

İstenmeyen Davranı şları Sı nı rlandı rmak

Probiyotikler: Probiyotik kullanı yorsanı z ve çocuğunuz agresifse veya probiyotiklere yeniden başladı ktan sonra agresif hale geliyorsa, ilk adı m olarak probiyotikleri çı karmayı düşünün. O kadar yüksek bir istila oranı olabilir ki, çocuğun sistemi iyi bakteri ve kötü bakteri arası nda ayrı m yapamaz.

Lavmanlar: CD lavmanları agresif/daha büyük çocuklar için tedavinin birinci gününde başlamalı dı r. Bu kadar yüksek bir istila oranı na sahip oldukları ndan, patojenleri en baştan sürekli bir döngüde temizlemek gerekir. Lütfen 103. sayfadan başlayan lavman talimatları nı takip edin.

Diyatomlu Toprak (DE): Bazı çocuklarda, DE daha büyük parazitleri parçalayarak öldürebilir ve bu parazitlerin çocuğun vücuduna ek toksinler atması na neden olarak herx semptomları na neden olabilir. DE'yi birkaç aylı ğı na bı rakmak, sı kı ntı yı hafifletmeye ve daha temiz bir öldürme sağlamaya yardı mcı olabilir.

Tuz Banyoları : Vücudun toksinleri yeterince hı zlı çı karamadı ğı zamanlar vardı r. Çok hı zlı öldürme konusunda dikkatli olun (yeterli lavman olmadan veya az dozlama). Lavman yaptı ysanı z ve hala sı kı ntı var gibi görünüyorsa, 40 kiloluk bir torba sade havuz tuzu alabilir, 9 kilo tuzu alı p sı cak bir banyoya koyabilirsiniz. Tuzun çözülmesine izin verin ve çocuğu bir saat bekletin. Çocuk banyo sı rası nda terlerse, toksinlerin dı şarı atı ldı ğı nı gösterdiği için bu iyi bir işarettir. Epsom tuzları kullanmayı n. Magnezyum içerirler.

Magnezyum biyofilm kadar parazitleri de besler. Sade havuz tuzu ucuzdur ve toksinlerin atı lması na yardı mcı olur.

Machine Translated by Google

3. Adı m - Kalcker Parazit Protokolü Karahindiba Çayı : Bu

aynı zamanda inanı lmaz bir detoks kaynağı dı r. Oğlumuzun birikmiş toksinleri atmak için bütün gün tuz banyosuna girip çı ktı ğı zamanlar karahindiba çayı içtiği zamanlar olmuştur. Bu, Traditional Medicinals® (traditionalmedicinals.com) tarafı ndan yapı lan hazı r bir çaydı r .

Parazitlerin Ortadan Kaldı rı lması Sı rası nda Neler Bekleneceğine İlişkin İpuçları

Bağı rsak parazitleri Dünya'da insanlardan daha uzun süredir var. Planları , bir ev sahibi bulmak ve yaşam yaratmaya devam etmektir. Çocuğunuzun içinde yaşayarak ev avantajı na sahip olurlar. Onlarla savaşı rken öğrendiğim birçok şey var. Onları n bir planı var ve senin de öyle olmalı .

Karşı laştı ğı mı z Durumlar

Peetox: Parazitleri öldürdükçe, onları n neşeli hayatları nı ellerinden aldı ğı nı z konusunda uyarı lı rlar. Sonuç olarak, hoşnutsuzlukları nı göstermek için ev sahibine bir şeyler yaparlar. Parazitlerin yaptı ğı şeylerden biri, çocuğunuzun idrar yapması gerektiğini veya idrar yaptı ğı nı hissetmemesine neden olabilecek morfin benzeri bir madde de dahil olmak üzere toksinleri kusmaktı r. Doğal olarak, bu kazalara yol açabilir. Bu çocuğun hatası değil, parazit eleme sürecinin sadece bir parçası . Yaptı ğı mı z en zor şeylerden biri 18 yaşı ndaki oğlumuzu yetişkin bezine yatı rmaktı . Kalbim kı rı lmı ştı çünkü ileriye gitmek yerine geriye doğru hareket ettiğimizi hissediyorduk.
Ancak bu sadece geçiciydi ve kendi onuru içindi. Özellikle okula gidiyorlarsa; belki de bir süre bebek bezinde olmak cevaptı r. Oğlumuz yaklaşı k iki ay boyunca onları n içinde ve dı şı ndaydı . Bu biter.

Sleepytox: Damlalarda yükseldikçe CD, bağı şı klı k sisteminin parazitleri dı şarı atması na yardı mcı oluyor. Bunu yapmak çok fazla enerji gerektirecek.
Unutmayı n, ev sahibi çocuğunuz ve devam eden bir savaş var! Bazen çocuğunuz günlerce yorgun olabilir. Oğlumuz tedavisinin başı nda neredeyse tüm yaz boyunca uyudu. Aradı kları dinlenmeye izin verin. Şimdi oğlumuz hafta sonları daha yüksek dozlarda CD alı yor ve o zamanlar da çok yorgun ve uyuyor.
Pazartesi sabahı na kadar, çabaları mı zdan sonra genellikle büyük, şişman bir ip kurdu yakalayabiliriz. Sleepytox harika çünkü evinizdeki "yapı lacaklar" listenizde çok şey yapabilirsiniz.

Davranı şlar/OKB/Tikler: Bazı ları , çocukları tedaviden önce sahip olmadı kları davranı şlara sahip olmaya başladı ğı ndan veya davranı şları n kötüleştiğini hissettiklerinden paniğe kapı labilir. Parazitlerin bir planı var. Hayatta kalmak ve üremektir. Döngüyü tekrarlamak için yumurtaları nı n bir konakçı ya geri dönmesini istiyorlar. Bu nedenle dı şkı yla oynama, makatı nı ağzı na götürme, parmakları nı sizin veya başka birinin ağzı na sokmaya çalı şma davranı şları nı görebilirsiniz. Parmak ve tı rnak çiğneme ve tükürme vardı r. Bunları n hepsi parazit kontrollü davranı şlardı r. Parazitleri ortadan kaldı rmanı n bu davranı şı en aza indirmeye yardı mcı olduğunu ve sonunda azalacağı nı bulduk. Ayrı ca olabilir

Machine Translated by Google

eklenmiş bir mineral eksikliği. BOLCA okyanus suyu vermenin bu davranı şları evcilleştirmeye yardı mcı olabileceğini bulduk. 19 yaşı ndaki oğlumuz günde 400 ml kaynak suyuyla karı ştı rı lmı ş 200 ml'den fazla OW alı yor.

POWS (Pissed-Off Worm Sendromu): POWS, siz doz kullandı ğı nı zda kendini gösterir ve çocuğunuz ağlı yor, volta atı yor ve/veya mutsuz görünüyor.
Bazen gerçekten de solucanları kı zdı rmı şsı nı zdı r ama onları öldürmüyorsunuzdur. Endişelerinizi her zaman Kerri ile kontrol edin. Ancak çoğu zaman cevap, aşağı değil, damlalar halinde yukarı çı kmaktı r. Onları öldürmelisin, kı zdı rmamalı sı n yoksa karşı lı k verirler.

Clear Zone: Bu süre dolunaydan yaklaşı k beş ila yedi gün önce olabilir; altı ay veya daha fazla tedaviden sonra istila bir kez azaltı ldı ğı nda. Çocuğunuzun aklı başı nda olduğuna dair anlı k görüntüler görmeye başlayabilirsiniz.
ATEC testi için iyi bir zaman.

Yüksek Hacimli Yeme: Çoğu zaman, çocuklar aç kaldı kları nı fark ettikleri bir noktaya gelirler. Parazitler, besinlerinin büyük bir kı smı nı alarak zihinsel eksikliklerine neden oluyor. Hatta bütün gün aralı ksı z yemek yiyor olabilirler. Sürekli yeme ile CD'nin zamanlaması ve etkinliği arası nda denge kurmak zordur. Çocuğun yüksek miktarda yemek yemesine izin verilirken CD verilirken parazitler yine de öldürülür, ancak CD seviyeleri bir herx'i önleyecek kadar yüksek olmayabilir. Parazitler öldürülebilse de, CD seviyesi, ölü paraziti yiyen bakterileri de öldürecek kadar yüksek olmayabilir. Bulduğumuz bir çözüm, oğlumuza günde birçok kez okyanus suyuyla ev yapı mı kemik suyu vermekti. Bu, besin eksikliğini gidermeye yardı mcı olurken, aşı rı yemeyi herx reaksiyonu riski olmadan CD'ye devam edecek kadar azaltı r.

Kilo Kaybı : Oğlumuz tedavinin ilk yedi ayı nda 50 kilo verdi. 5'9 ”ve 200 pound ile çok fazla kiloluydu. Kilo kaybı , onu uzun süredir görmemiş olan insanları endişelendirdi. Bu süre zarfı nda 35 kilo katı parazit olduğunu tahmin ediyorum. Yüzü gibi midesi de çok şişmişti. Çocukları mı z parazitler ve patojenlerle (örn. maya, bakteri vb.) doludur ve bunları n tümü kilo almaları na veya şişkinliklerine neden olabilir. Oğlumuz artı k boyuna göre normal kilo aralı ğı nda ve düz bir karı na sahip.

Gece Korkuları : Gece boyunca çocuğunuzun sakinleşmekte zorlandı ğı nı görebilir veya gece sizin adı nı zı haykı rarak uyanabilir. Hatta muhtemelen uyurgezer bir durumda ön kapı dan çı karak gece yürüyüşü bile yapabilirler. Bu davranı şları yı llar önce oğlumuz daha yüksek bir istila seviyesine doğru ilerlerken gördük. Artı k iyileşme aşaması nda olduğumuza göre, davranı şları n çoğu bir tür geri sarma olarak geri dönüyor. Merdivenden aşağı inerken ortaya çı kan davranı şlar bazen merdivenden sağlı klı yaşama doğru tekrarlanı r. Oğlumuzun ayrı lı k kaygı sı yaşadı ğı nı ve bunun farkı na vardı ğı nı hissediyoruz.

Machine Translated by Google

kontrole sahipti. Bu yeni kazanı lan bağı msı zlı k korkutucu olabilir.
Bir noktada oğlumuz peetox aşaması na girdi (yukarı ya bakı n). İdrar yapma hissi veya hissi yoktu, bu yüzden yetişkin bezlerine yerleştirildi. Oğlumuzun enfeksiyon oranı azaldı kça gece uyanma ve idrara çı kma isteği gibi normal davranı şları geri geldi. Sonra, tuvalete gitmek için kalkacağı sı rada aniden durur ve belki de kaybolmuş hisseder ve bu işe tek başı na devam etmekten korkardı . Çı ğlı k atacak ya da sı zlanarak ortalı kta dolaşacaktı . Gece uyanmaları rahatsı z edici olsa da, oğlumuzu gerçeğe dönüştürmek için gerekli bir geçit olarak gördük. Geceleri rahatlı k sağlamak için CD nemlendiriciye, CD kulak ve burun damlaları na devam ettik. Çoğu zaman yatmadan önce bir CD banyosu da sakinleştiriciydi.

Duygusal Körlük: Parazitler tarafı ndan salgı lanan toksinler morfin, amonyak ve histamin etkisine sahip maddeler olduğu için bu toksinler çocuğunuzda duygusal karmaşaya neden olabilir. Kahkahaları nı z, gülümsemeleriniz ve şefkatinizle karı ştı rı labilirler. Pozitif ve sevgi dolu karşı laşmanı z tehdit edici veya meydan okuyucu olarak algı lanabilir. Gülüşün öfke getirebilir.
Söylediğiniz herhangi bir söz, ne kadar yatı ştı rı cı olursa olsun, bir yüzleşme olarak algı lanabilir. Bu hem ebeveyn hem de çocuk için zordur, çünkü çocuk sizi bir tehdit olarak görebilir ve hatta belki de onlarla alay ediyor olabilir; ebeveyn olarak siz sevginizde reddedilmiş hissediyorsunuz. Çoğu zaman, çocuğun davranı şları taşlanmı ş bir gerçeklik ve mevcudiyet kaybı na dönüşür. Bunları n hepsi parazitlerin toksik oluşumu ve savunması ile ilgilidir. Motivasyonları ev sahibinde kalmaktı r; eleme girişimlerimizde onlara verdiğimiz rahatsı zlı klardan memnuniyetsizliklerini gösteriyorlar. Çoğu zaman bu bölümler sı rası nda, kelimelerden veya göz teması ndan kaçı nmanı n en iyisi olduğunu gördük, bunun yerine Kerri tarafı ndan belirtildiği gibi çift doz vermeyi ve sakin bir ortam sağlamayı tercih ettik. Bu toksik seviyelerin tuz banyoları ve karahindiba çayı ile düşürüle

Bir parazit protokolünün getirebileceği davranı şlara rağmen, sonuçlar şaşı rtı cı dı r. Ailemizde nihayet oğlumuzu geri alı yoruz. Kursta kalmanı tavsiye ederim. Bildiğimiz gibi, bağı şı klı k sistemi baskı lanmı ş çocuklarda bu tür parazit enfestasyonları kendi başları na ortadan kalkmayacaktı r.
Çocuklar solucanlardan "büyümez". Aslı nda solucanlar içlerinde büyümeye devam edecek. Aşağı daki parazitler, büyük oğlum tarafı ndan daha büyük çocuklara yönelik agresif modifikasyonlar yapı larak dı şarı atı ldı . Bu parazitleri ortadan kaldı rarak iyileşmenin ilk aşamaları nı görüyoruz. Bir sonraki sayfadaki kavanozlar, iki aydan daha kı sa bir sürede yedi kilo solucanı temsil ediyor.

Şifa içinde senin,
robin

Machine Translated by Google

7 kilo 35 lbs. (toplam) 9 ayda çı karı lan parazitler (yukarı da toplam 160 fit).

39+ inç uzunluğunda solucan.

Machine Translated by Google

Adım 3 - Kalcker Parazit Protokolü

Diğer Şifalı Bitkiler

Yazarın Notu: Aşağıdaki bilgiler, sürekli sağlığımız ve esenliğimiz için son derece güçlüdür. Ancak, bu bitki ve yiyeceklerin TEK BAŞINA otizmi iyileştirdiği kanıtlanmamıştır. Bunun yerine, sayfa 187'den itibaren sunulan 18 günlük solucan giderme protokolünü takip edin. Bu, 12-18 ay boyunca yapıldığında, birçok çocuğun iyileşmesine yol açan protokollerin önemli bir parçası olduğu kanıtlanmıştır. Bunu göz önünde bulundurarak, daha büyük çocukların ve agresif/kendine zarar veren çocukların bazı ebeveynleri, yukarıda belirtilen 18 günlük protokole ek olarak aşağıda listelenen bitki ve yiyeceklerden birkaçını uygulamaya başlamıştır. Çoğu durumda, bu eklemeler, çocukların artan parazit eliminasyonu yoluyla daha fazla kazanç elde etmelerine yol açmıştır.

Bir dizi başka bitki de solucan giderme için etkilidir. Üç aylık tedaviden sonra sorun devam ederse bitkinin türünü değiştirebilir veya önceki aylarda etkili olan herhangi bir bitkiyi tekrarlayabiliriz. Bunları kombinasyon halinde kullanabilir, birkaç bitkiyi aynı anda karıştırabilir veya ayrı ayrı alabiliriz. Dikkate alınması gereken bitki formülasyonları, yağda veya infüzyonla elde edilen alkollü ekstraktlardır ve aşağıdaki bitkileri içerir:

- Karanfil (Syzygium aromaticum)
- Adi sedir (Ruta graveolens)
- Karahindiba (Taraxacum officinale)
- Centian Kökü (Gentiana lutea)
- Nane (Mentha sativa)
- Pelin/Pelin (Artemisia vulgaris)
- Nar Kökü Kabuğu (Punica granatum L.)
- Güney Odu (Artemisia abrotanum)
- Tatlı Pelin (Artemisia annua)
- Tatlı bayrak/Kamış Kökü (Acorus calamus)
- Solucan otu (Tanacetum vulgare)
- Ceviz kabuğu (Juglans)
- Beyaz Fraxinella (Dictamnus albus)
- Civanperçemi (Achillea millefolium)

Önleyici Gıda ve Diyet

Paraziter bir enfeksiyonunuz varsa kaçınılması gereken yiyecek grupları vardır. Örneğin, genel olarak süt ürünleri, rafine şekerler (sakaroz, fruktoz, mısır şurubu), un (özellikle rafine edilmiş) ve genel olarak aşırı tatlı yiyecekler. Aşağıdaki yiyecek ve bitki listesi vücudun iyi bir iç dengesini destekler, dolayısıyla müttefikimiz olur. Mide asidinin iyi üretimi, normal düzeyde sağlıklı bakteri ve uygun safra üretimi ile parazitlerin uzun süre hayatta kalması imkansızdır. Solucanlar, şekerlerin parçalanmasından ve sağlıksız veya işlenmiş gıdaların yutulmasından kaynaklanan çürümeden kaynaklanan asidik bir ortama ihtiyaç duyar. Çiğ sebze yemek çok önemlidir ve

Machine Translated by Google

korumak için gerekli olan enzimleri ve diğer elementleri sağlayan meyve suları .

Choucroute/sauerkraut (tuzda fermente edilmiş lahana).

Birçok insanda, vücut davetsiz misafirlere karşı kendini savunamadı ğı için birçok bağı rsak sorununun nedeni olan mide asidi seviyesi düşüktür. Lahana turşusu suyu veya lahana/lahana turşusu, vücudunuzun mide asidi üretmesi için en güçlü uyarı cı lardan biridir. Pastörize edilmemiş fermente gı daları n (su kefiri, soya sosu, miso vb.) kullanı lması , parazitler üzerinde kontrol sağlamaktan sorumlu faydalı bakteri florası nı uyarması açı sı ndan şiddetle tavsiye edilir. Yemeklerden önce birkaç kaşı k lahana suyu veya daha iyisi lahana turşusu suyu alı n, çünkü sindiriminizi iyileştirmek için harikalar yaratacaktı r.

Yazarı n notu: OSB'si olan hiç kimseye soyanı n hiçbir şeklini önermiyorum.

Sarı msak

Düzenli olarak tüketilen sarı msak, mide ve bağı rsağı parazitler için öldürücü bir ortam haline getirerek sürekli koruma sağlar. Sarı msak, bağı rsak parazitlerini doğal olarak ortadan kaldı rmak için mükemmel bir ev ilacı dı r. Çin, Yunan, Roma, Hint ve Babil gibi birçok farklı kültür tarafı ndan kullanı lmı ştı r.

Sarı msak, günümüzde modern tı p pratisyenleri tarafı ndan hala kullanı lmaktadı r. Hem taze hem de yağ olarak kullanı lı r. En basit tedavi, her sabah üç diş sarı msak yemek veya bir çay kaşı ğı sarı msak yağı almaktı r. Alternatif olarak, ezilmiş sarı msağı biraz soğuk suyla karı ştı rı n ve karı şı mı hemen için. Başka bir tarif, dört diş sarı msağı kesip ezmek, sütün içine koymak ve karı şı mı gece boyunca bekletmektir. Ertesi gün oruç tutarken sı vı yı alı n.

Balkabağı tohumu

Kabak çekirdeği piperazin adı verilen bir madde içerir. Parazitleri felç ederek etki ederek kolayca uzaklaştı rı lmaları nı sağlar.

Piperazini ticari olarak eczane ilaç formülasyonları nda veya dediğimiz gibi doğal olarak kabak çekirdeğinde bulabiliriz. Bu geleneksel haşarat giderme yöntemi, insanı n kendini bilip bilmediğinden beri dünyanı n her yerinde kullanı lmaktadı r. Birkaç etkili geleneksel formül vardı r, aşağı da bunlardan birini açı klı yoruz:

Bir bardak soyulmuş ve ezilmiş kabak çekirdeği kullanı n (yaklaşı k 80 tohum). Hindistan cevizi suyu ve iki yemek kaşı ğı bal ile karı ştı rı n. karı şı mı al

Machine Translated by Google

Adım 3 - Kalcker Parazit Protokolü, aç karnına üç

saatten fazla. Bu üç saatlik süre boyunca yemek yemeyin. Üç saatin sonunda parazitleri hızla yok etmek için hint yağı alın.

Papaya ve Papaya Tohumları

Papain, papayada bulunan ve yetişkin parazitlerin dış katmanını parçalayabilen bir sindirim enzimidir. Olgunlaşmamış papayanın sütlü suyu, yuvarlak solucanları yok etmek için güçlü bir ajandır. Yetişkin dozu, bir çorba kaşığı taze yeşil papaya suyu, eşit miktarda bal ve üç veya dört çorba kaşığı sıcak sudur. İki saat sonra, ılık sütle karıştırılmış bir doz hint yağı verin. Gerekirse bu tedavi iki gün boyunca tekrarlanmalıdır. Yedi ila on yaş arası çocuklar için bu dozun yarısı uygulanmalıdır. Üç yaşından küçük çocuklar için karışımdan bir çay kaşığı (5ml) yeterlidir.

Papaya tohumları da papain ve karisin açısından zengin oldukları için bu amaç için faydalıdır. Her yemek kaşığı ezilmiş taze tohum için eşit miktarda bal ekleyin. On gün boyunca sabah veya akşam aç karnına günde bir çay kaşığı (5 ml) dozu alın, beş gün dinlenin ve döngüyü üç kez tekrarlayın. Bir müshil kullanmanızı öneririz.

Zencefil

Zencefil sadece bağırsak parazitleriyle savaşmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bulantıyı azaltır ve sinirleri sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Yüzlerce yıldır taze zencefilin bağırsak kurtlarını yok etmede oldukça başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Zencefil tüketmenin en yaygın yolu çiğ veya infüzyondur. Zencefil özü ayrıca çeşitli yiyeceklerin üzerine serpilebilir.

propolis

Propolis, kovanları dezenfekte etmeye, inşa etmeye ve bakımını yapmaya yardımcı olmak için arılar tarafından ağaçların kabuk ve yaprak tomurcukları ndan toplanan reçine benzeri bir maddedir. Propolis en az 3000 yıldır kullanılmaktadır. Kullanımı Mısırlılar ve Romalılara kadar uzanır ve günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. "Önce" anlamına gelen pro ve "şehir" anlamına gelen polis adlarını Yunanlılara borçluyuz. Bu, "şehrin önündeki savunma" veya "şehrin savunucusu" olarak tercüme edilir. Propolisin virüs ve bakterilerin faaliyetlerine karşı koruyan antibiyotik etkisi sayesinde kovan, doğanın bildiği en steril yerlerden biridir.

Birçok bilimsel çalışma, propolisin antiparazitik aktivitesini kanıtlamıştır, bu nedenle aşağıdakilerin tedavisi için tavsiye edilir: Giardia, amipler ve yuvarlak solucanlar ve ayrıca gram-pozitif bakterilerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonları.

Machine Translated by Google

Parazit tedavisi için su veya meyve suyu ile seyreltilmiş propolisi yedi gün boyunca aç karnı na alı n. Propolis tentüründe veya kapsüllerinde %30 oranı nda standardize edilmiş Propolis kullanı n. Kilo başı na üç damla veya her yemekten yarı m saat önce üç kapsül alı n. Yedi günlük bir tedavi döngüsü, yedi gün açı k, ardı ndan yedi gün ara vermelidir; parazitlerin veya bakterilerin tamamen ortadan kaldı rı lması nı sağlamak için üç ila beş kez tekrarlayı n. Tedavinin tekrarı bakteriyel üreme döngülerini durdurmak için esastı r. Tedavi en az üç kez tekrarlanarak parazitlerin etkili bir şekilde yok edilmesi sağlanı r. Propolisin faydaları , yan etkisinin olmaması , iyi tolere edilmesi ve oldukça etkili olması dı r.

Nar Kabuğu Nar

kabuğu, solucanlar için oldukça zehirli olan punisin olarak bilinen bir alkaloid içerir. Kök kabuğu, gövde veya meyve kaynatı larak kullanı lı r. Kök kabuğu tercih edilir, çünkü gövde kabuğundan daha fazla miktarda alkaloit içerir. Bu alkaloid ayrı ca tenyalar için oldukça zehirlidir. Tercihen taze olan soğuk kök kabuğu kaynatma, bardaklar arası nda bir saatlik aralı klarla günde üç kez (yetişkinler için) 90 ml ila 180 ml'lik miktarlarda verilmelidir. Son bardaktan sonra müshil alı nmalı dı r. Çocuklar için 20 ml ila 60 ml'lik bir doz uygundur. Solitaire'leri (tenya, Taenia Solium) ortadan kaldı rmak için tercihen bir kaynatma kullanı lı r .

Havuçlar

Havuç, çocuklarda bağı rsak parazitlerini ortadan kaldı rmak için başka bir etkili ev ilacı dı r. Havucun kimyasal bileşenleri haşerelerin gelişimini engelleyerek onlara saldı rı r. Sorun ortadan kalkana kadar her sabah küçük bir kase rendelenmiş havuç verildiğinde, çocuklar için en etkili doğal tedavilerden biridir.

çeşniler

Baharat bitkileri, günlük yemek pişirmemizde akı lda tutulması gereken güçlü silahlardı r. Çok eski zamanlardan beri, insanlı k onları parazitik hastalı kları kontrol etmek için kullandı . Aşağı dakiler, etkileri nedeniyle en ilginç olanlardı r:

• Cayenne • Tarçı n • Karanfil • Paprika • Biber • Tarhun • Kekik • Zerdeçal

Machine Translated by Google

Miriam'a, yalnı zca otizmli çocukları n aileleri için değil, aynı zamanda parazitik enfeksiyonlarla tutarlı gizemli semptomlardan muzdarip dünyanı n her yerindeki insanlar için çok aydı nlatı cı olacağı nı bildiklerimi paylaştı ğı nı z için teşekkür ederim. Parazitler ve parazit protokolü hakkı ndaki SSS'lere geçmeden önce parazit enfeksiyonları hakkı nda ilginç bir bilgi paylaşmak istiyorum.

"Burada, ABD'de çok büyük bir parazit sorunumuz var. Bu sorunu çözmüyoruz."5 - Dr. Peter Wina, 1991'de Walter Reed Ordu Araştı rma Enstitüsü'nde Pato-Biyoloji Şefi. (Sorun 1991'de vardı , ve modern küreselleşmeyle birlikte parazitler her zamankinden daha yaygı n, ancak yine de ele alı nmı yorlar.

Parazit Protokolü SSS

Aile hekimime bulduğumuz solucanları n resimlerini gösterdim. Bunları n parazit olmadı ğı nı , sadece mukus olduğunu düşünüyor. Nası l emin olabilirim?

> Parazitleri belirlemek zor olabilir ve pratisyen hekimlerin çoğu bunu yapmak için eğitilmemiştir. Bazı ebeveynler, numuneleri ofislerinde analiz eden yerel bir veterinerle başarı lı olur. Kaba bir test olarak numunenizin üzerine kaynar sı cak su dökebilirsiniz. Parçalanı rsa, muhtemelen biyofilm veya mukustur. Yı kamaya karşı dayanı klı ysa muhtemelen bir parazittir. Ne yazı k ki, çoğu dı şkı analizi yanlı ş negatif sonuçlarla ünlüdür. Parazitlerin üzerine sı cak su koyarsanı z çözülmezler. Mukus, sı cak veya soğuk herhangi bir suda çözünür.

Hamilelik sı rası nda Kalcker Parazit Protokolü yapmakta sakı nca var mı ?

> Hayı r. Hamileyken veya emzirirken herhangi bir detoks veya parazit protokolü yapmayı n. Herhangi bir detoks, gelişmekte olan fetüsü veya emzirilen bebeği potansiyel olarak olumsuz yönde etkileyebilecek toksinleri kan dolaşı mı na salacaktı r. Hamile kalmayı planlı yorsanı z, hamilelikten önce herhangi bir detoks veya haşarat giderme prosedürü yapmanı z tavsiye edilir.

Parazit protokolünü durdurmak ne zaman uygundur? Başka bir deyişle, bu protokoldeki her çocuğun hem CD'ye hem de Parazit Protokolünün diğer bölümlerine ihtiyacı var mı , yoksa sadece CD'ye ihtiyaç duyanlar mı var? Bu kritik bir sorudur çünkü bunlar birleştirilmiş iki protokoldür ve her çocuğun ikisine de ihtiyacı olmayabilir. Parazit Protokolünü yaptı k ve parazitleri hiç geçirmedik, bu yüzden çocuğumdan emin değilim.

> Genellikle Parazit Protokolü 12-18 ay, bazen daha az tekrarlanı r. En önemli şey, daha sonraki bir tarihte yumurtadan çı kabilecek döllenmiş yumurta kalmadı ğı ndan emin olmaktı r. Kalan yumurta olup olmadı ğı nı anlamak çok zor olduğu için 12-18 ayı tamamlamak önemlidir.

Machine Translated by Google

tedavisi. Parazit Protokolü, en iyi sonuçları elde etmek için yoğun bir şekilde araştı rı lan eksiksiz bir protokoldür. CD ile birlikte Parazit Protokolünün, gerileyen otizmi iyileştirmek için en etkili yöntemlerden biri olduğu gösterilmiştir. Parazitler döngüseldir ve bu şekilde tedavi edilmeleri gerekir. Davranı şta veya dı şkı da artı k parazit görülmeyene kadar parazit protokolüne devam edersiniz.

Beyni zehirleyen solucanları n süreci nası l görünüyor?

Örneğin Ascaris lumbricoides (yuvarlak kurt), en az beş farklı toksin üretir: Malondialdehit, amonyak, histamin, formaldehit ve morfin. Malondialdehit oksidatif stresten sorumludur ve mutajeniktir.7 Hiperamonyemiye yol açabilen amonyak, nöbetler, titreme, kanat çı rpma, zayı f koordinasyon, büyüme geriliği, hı rçı nlı k, uyuşukluk ve diğer semptomlardan sorumlu olabilir. Hiperamonyemi, gerileyen otizm olarak bilinen semptomlarla karşı laştı rmak, ezici benzerlikler sağlar. Formaldehitin bazı laboratuvar çalı şmaları nda lenfatik ve hematopoietik sistemleri etkilediği gösterilmiştir.

Morfin sinir reaksiyonları nı inhibe eder ve bağı rsak peristaltizmini yavaşlatı r. Ayrı ca bağı şı klı k sisteminin parazitleri bulması nı ve onlar hakkı nda herhangi bir şey yapması nı engeller. Bu, genellikle parazitleri tanı mlayamamamı zı n bir nedenidir. Parazitleri yalnı zca enfeksiyon akut olduğunda buluruz, kronik değil. Bunun nedeni, IgE veya IgM reaksiyonları nı n morfin tarafı ndan değiştirilmesidir. Histamin vücutta kronik iltihaba yol açabilir.

Ailece bir süre daha CD ve parazit protokollerini yapmayı bekliyoruz. Ne zaman duracağı mı zı nası l bilebiliriz? Birkaç ay semptomsuz kalana kadar beklemeli miyiz?

Tam iyileşme sağlanana kadar yapı yoruz.

Tam oral doz CD ve Parazit Protokolü yapı yoruz.
Bazı şaşı rtı cı değişiklikler görüyoruz, ancak solucan görmüyoruz. Yanlı ş bir şey mi yapı yoruz?

CD, farklı boyutlardaki parazitleri etkiler. Çı plak gözle tespit edilemeyecek parazitleri veya çok küçük ve bu nedenle dı şkı da tespit edilmesi zor olan nematodları temizliyor olabilirsiniz.

Çocuğumun vitaminleri neden bu kadar eksik?

Genel bir kural olarak, otizmli çocukları n çoğunda vitamin eksikliği vardı r. Her şeyden önce, birçok patojen konakçı ya yönelik vitaminlerle beslenir ve helmintler özellikle B12 ve demiri sever. Birçoğumuz, özellikle de soğuk iklimlerde yaşayanları mı z yeterince güneş alamadı ğı mı z için D vitamini eksikliği yaşı yoruz. Kalsiyum vücut tarafı ndan asit iltihabı için bir antagonist olarak kullanı lı r; vücuttaki tüm asitlik kalsiyum tarafı ndan telafi edilir ve bu nedenle spektrumdaki çocuklarda genellikle düşüktür. Çocukları mı z iyileştikçe bu eksiklikler kaybolur ve homeostaz geri gelir.

Machine Translated by Google

verdim, bu AM'de pirantel değil. Ne yapmalı yı m?

stres yapma Yarı n yeni bir gün ve yeniden başlayabilirsiniz. Yarı nı n planlanan dozu olduğu için yarı n mebendazol ver.

Bize iyi gelen, bağı şı klı ğı mı za ve bağı rsakları mı zı n iyileşmesine yardı mcı olan bazı parazitler yok mu?

Parazit, hayatta kalmak için bir konağa bağı mlı olan ve o konağı n zararı na olan bir canlı varlı k olarak tanı mlanı r.

Yeni aya kadar parazit protokolüne devam edenler için, onda kaç gün kalacaksı nı z? Yeniayı 3 gün geride bı raktı k.

Bazı insanlar aylarca tedavi eder. Kalcker protokolünün kendisi 18 gündür. Her aile kendisine uygun bir protokol bulmalı dı r. Bazı insanlar yeni aydan 3 gün önce, yeni ay günü ve üç gün sonra mebendazol kullanı yor.
Diğer aileler tatil günlerinde bitkisel ilaçlar kullanı rlar. Bir sağlı k uzmanı na danı şı rsanı z, bu onlara sorulacak bir soru olacaktı r. Parazitlerin tedavisi söz konusu olduğunda her çocuk benzersizdir ve farklı ihtiyaçları vardı r.

Canlı solucanlar neden sindirilmez? Zehirler mi?

Canlı helmintler, pozitif yüklü iyonlara sahip bir glukozoid mukus tarafı ndan korunur ve bu da onları mide asidine veya sindirim sı vı ları na karşı dirençli hale getirir. Öldüklerinde mukus helmintten ayrı larak onları sindirim enzimlerine açı k bı rakı r. Protokolü kullanan kişilerin dı şkı sı nda mukusun yanı sı ra yarı sindirilmiş helmintleri sı klı kla görüyoruz.

Ailedeki herkesin aynı anda parazit protokolünü yapması gerekiyor mu? CD, lavman, iki atomlu toprak, Rompepiedras/taş kı rı cı lar ve hint yağı olan veya olmayan? (Nörotipik) kı zı m anti-parazitik ilaçlar, mebendazol ve pirantel pamoat alacak, ancak bu diğer parazit protokolü bileşenlerini almayacak, bu yüzden soruyorum.

Tüm ailenizin protokolü aynı anda yapması gerekiyor, yoksa yeniden enfeksiyon kapma riskiyle karşı karşı ya kalı rsı nı z. Nörotipik aile üyeleri protokolün mümkün olduğunca çoğunu yapmalı dı r. Birisi sadece ilaçları alacaksa, öyle olsun.
Ancak, ne kadar çok olursa o kadar iyi hissediyorum.

Neem'i CD'den ayı rmam gerekir mi?

Evet, neem'i yemekle birlikte veririm ve CD'den en az bir saat ayı rı rdı m.

Herhangi bir solucan görmezsem, bu çocuğumda parazit olmadı ğı anlamı na mı gelir yoksa sadece yumurtaları mı kaçı rı rı z?

Parazit görmemeniz sizde hiç olmadı ğı anlamı na gelmez. Örneğin, evcil hayvanları mı zda çok yaygı n olan (ve insanları Toxocariasis olarak enfekte edebilen) Toxocara canis veya Toxocara cati dı şkı yla dı şarı atı lmaz. Protokoldeki bazı aileler, yedinci aya kadar gerçek solucanlar görmediler.

Machine Translated by Google

kalanı mı zı n CD protokolünü ne ölçüde yapması gerekiyor? OSB çocukları mı zla aynı mı ? Ve 12 ay boyunca tüm dokuz yardayı tam Parazit Protokolü ile yapmak gerekli midir?
Daha sağlı klı bireyler için kı sayollar var mı ?

Evcil hayvanlar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerinin bir yı l boyunca parazit önleyici tedavi görmesi gerekir ve bundan sonra ömür boyu bakı m en iyisidir. Daha önce bahsedildiği gibi, nörotipik aile üyeleri söz konusu olduğunda elinizden gelenin en iyisini yaparsı nı z, ancak anti-paraziter ilaçlar yeniden enfeksiyonu önlemek için çok önemlidir.

Diyatomlu toprak bir bağlayı cı mı dı r ve bu nedenle gı da, ilaç ve takviyelerden ayrı olarak verilmeli midir?

Hayı r. Bağlayı cı değildir. Yemekle birlikte veya yemeksiz verilebilir ve ilaç veya takviyeleri etkilemez.

Tamamen iyileştiyseniz Protokolü sonsuza kadar yapmak zorunda mı sı nı z yoksa bir bakı m planı var mı ?

Çocuk onu istediğiniz yere geldiğinde, bir şeyler çekmeye başlayabilirsiniz. Ardı ndan, CD'nin bakı m dozunu yapı yoruz; Pazartesi günü bir doz ve Perşembe günü bir doz. Parazitlerle dolu bir dünyada yaşadı ğı mı z için her üç ayda bir Parazit Protokolü yapı yoruz. Herkes için iyi bir koruyucu ilaçtı r. Okyanus suyu da hepimiz için iyidir. Bakı m planı nı n tamamı için Bölüm 13'e (sayfa 319) bakı n.

CD parazitleri öldürür mü?

Evet. CD, amipleri, Giardia lamblia'yı ve diğer küçük parazitleri öldürür. CD, daha yüksek oksidatif stres dirençleri nedeniyle daha büyük makroparazitleri öldürmez.

Tam CD dozuna ulaşmadan önce parazit protokolünü başlatmak ne zaman uygundur?

Otizmi iyileştirmek bir kı sa mesafe koşusu değil, bir maratondur. Önemli olan en az şiddetlenme ile iyileşmek. Bu nedenle, başlamadan önce tam bir CD dozunda olmanı z ve lavman ve banyolara eklemiş olmanı z gerekir. Herxheimer reaksiyonları görüyorsanı z, henüz başlamayı n. Açı kçası , herkes kendi kararları nı vermelidir.

Helmintler bağı rsakta nerede yaşar? CD lavmanları (300 ml) onlara ulaşı r mı ?

Helmint türüne bağlı dı r. 300'den fazla farklı helmint vardı r, bu nedenle birçok farklı yerde olabilirler. Ancak çoğu ince bağı rsakta yaşar. Bazı ları yumurtaları nı rektuma bı rakı r. Kişinin boyutu, bir lavmanı n ne kadar yükseğe ulaşacağı nı belirleyecektir.

Machine Translated by Google

Çocukları nı za solucanları olduğunu söylüyor musunuz? Onlara gösteriyor musu
Korktular mı ? Oğlum dünyadaki her şeyle çok ilgileniyor ve günde 4.000 soru soruyor.
Ona ne söyleyeceğim?

Bu durumla nası l başa çı kı lacağı her aileye özgüdür. Burada doğru ya da yanlı ş cevap yoktur. Protokolle ilgili ailelerden aldı ğı mı z bazı öneriler şöyle:

Hayı r. Kocam bana çocukken yaşadı ğı bir hikayeyi anlatı yordu, sürekli solucanları olduğu için alay edilen başka bir çocuk hakkı nda. Hala hatı rlı yor. Yani, hayı r çocukları ma söylemeyeceğim.

Çocukları m (10 ve 7 yaş) solucanları biliyor çünkü onları n Lyme hastalı ğı ve diğer semptomları hakkı nda uzun süredir konuşuyoruz. Bence neden huysuz veya hasta hissettiklerini ve lavmanları n neden yardı mcı olduğunu anlamaları na yardı mcı oluyor. Ama bence her çocuk farklı dı r. Risk, arkadaşları na söyleyebilmeleridir. Onlara bunun özel bir bilgi olduğunu ve hemen hemen herkesin solucanları olduğunu ama bazı insanları n daha fazla olduğunu ve onlardan hastalandı kları nı söylüyorum. Ve onlara çoğu doktorun bile bunu bilmediğini ama yavaş yavaş insanları n bunu öğrendiğini ve bu konuda daha akı llı hale geldiğini ve iyi bir diyet vb. Oğulları m büyükleri görmeyi ve yeni rekorlar denemeyi seviyor dedim. Kardeşlerine kayı tları göstermeyi severler. Bence bu bir erkek meselesi.

10 yaşı nda bir oğlum var ve ona parazitlerimiz olduğunu söylüyorum. Ona hiçbir şey göstermedim, kakayı ayı rmaya başlamadan önce odadan çı kması nı rica ediyorum. ;)

Oğlumun solucanlarla, kı l kurduyla TAM bir bağı rsak hareketi daha oldu - ve yüzlerce demek istiyorum. Bu sadece CD'deki ikinci günümüz (8 fl. oz'da 1/2 düşüş) bu yüzden biraz derinlere atı ldı . Böyle bir başlangı ç yapan var mı ? Her şey oradan nası l gitti?

Birkaç kez gördüm. Bu konuda ÇOK heyecanlanı yorum. Herkesin biraz farklı otizmi vardı r. Ancak solucanları erken görürsek, çoğu durumda iyileşme de erken başlar. Çocuğunuz için durum böyle olabilir.

Organik ürünlerin bile düzgün bir şekilde yı kanması gerektiğini anlı yorum.
Meyve ve sebzelerimi yı kamanı n en iyi yolu nedir?

Ascaris yumurtaları UV'ye dayanı klı dı r ve 2 ila 11,5 pH'a dayanabilir. Yumurtalar yaklaşı k 60°C'ye (140°F) ı sı tı larak öldürülür. Meyve ve sebzelerinizi CD spreyi ile püskürtün. 1 fl başı na 10 damla oz., su, durulamaya gerek yok.

Parazit protokolünü başlattı ktan sonra büyük bir büyüme atağı fark eden var mı ?

Birçok ebeveyn, çocukları nı n kilo alı mı nı n yanı sı ra büyümeye devam ettiğini bildirdi. Parazitlerin onlardan aldı kları nı geri aldı kları düşünülürse, gerçek bir sürpriz değil.

Machine Translated by Google

Kalp kurdu alı yorlarsa evcil hayvanları mı zı tedavi etmemiz gerekir mi?
ilaç tedavisi?

Evet, kalp kurdu ilaçları bizi ve çocukları mı zı enfekte edebilen bağı rsak parazitlerini tedavi etmez. Evcil hayvanları mı zı da parazitlerden arı ndı rmamı z gerekiyor. kendimiz olarak

Hint yağı yerine "cascara sagrada" koyduk çünkü benim ve oğlumun yağı alması zor. Tamam mı ?

Cascara sagrada, hint yağı ile aynı şey değildir ve protokolün bir parçası değildir. Sı vı hint yağı na alternatif bir çözüm, yumuşak jellerde hint yağı satı n almaktı r. Çok ihtiyacı nı z olacak ama tat problemini çözüyor.

Oğlum, az pişmiş et veya domuz etinden kaynaklanan bir yuvarlak kurt olan Trichinella spiralis açı sı ndan çok yüksek. ABD'de nadir olması gerekiyordu, bu yüzden çocuğumun bunu nası l anlayacağı nı merak ediyorum. Herhangi bir fikir?
Burada çocuklar için az pişmiş et yok ve domuz eti de yemiyoruz.

Şu anda Trichinella spiralis ile otizm arası nda bir ilişki görmedik . Çok parazitli bir enfeksiyon veya yanlı ş teşhis olabilir. Standart protokol dı şı nda çocuğunuzun başka bir şeye ihtiyacı olabilir. Uygun dozaj için ve yalnı zca çocuğunuzda kesin bir Trichinella spiralis teşhisi varsa uygulayı cı ya danı şı rdı m.

Beyinde parazit olup olmadı ğı nı nası l anları z ve ne yapabiliriz?
bu konuda ne yapı yoruz?

Beyindeki parazitler çok nadirdir. (CDC'ye göre Sistiserkoz , domuz tenyası nı n larva kistlerinin neden olduğu parazitik bir doku enfeksiyonudur .
Bu larval kistler beyin, kas veya diğer dokuları enfekte eder ve çoğu düşük gelirli ülkede erişkin başlangı çlı nöbetlerin ana nedenidir. Bir kişi, bağı rsak tenyası olan bir kişinin salgı ladı ğı yumurtaları yemekten sistiserkoz alı r.)6 Larvalar bir taramada görülebilir. Pek çok insan, davranı ş sorunları na veya zihinsel sorunlara neden olan sorunun beyinde olması gerektiğini varsayar. Ancak, sorun muhtemelen başka bir yerde var. Kan toksin içeriyorsa, bu beyni etkiler. Örneğin çok fazla alkol alı rsanı z beyniniz, sinir sisteminiz vb. etkilenir ama sorun beynin kendisinde değildir. Aynı şeyi parazitler için de düşünebiliriz. Ürettikleri kimyasallar beyni etkiler, ancak nadiren parazitler beyinde yerleşir.

Parazitler otizme neden olur mu? Eğer öyleyse neden paraziti olan her çocuk otizmli olmuyor?

Gerileyen otizm, Dr.
Andreas Kalcker. Bu, belirli aşı ları alan parazitli bir çocuk arası ndaki çapraz reaksiyondur. Kesin bir sonuç için daha fazla araştı rmaya ihtiyaç vardı r
cevap.

Machine Translated by Google

3. Adı m - Kalcker Parazit Protokolü Normal laboratuvar testleri neden parazitleri bulamı yor?

Genel olarak konuşursak, laboratuvar testlerinin canlı ları veya yumurtaları bulması gerekir. Yumurtalar ayı n yalnı zca belirli günlerinde bulunur ve o günlerde bile belirli bir dı şkı örneğinde bulunmaları gerekmez. Canlı solucanlar dı şkı da son derece nadirdir çünkü genellikle öldükten sonra geçerler. Dı şkı da atı lmaktan kaçı nmada çok iyidirler.
Ayrı ca, içsel olarak ölürlerse, dı şarı atı lmadan önce vücudumuzda kı smen veya tamamen sindirilebilirler.

Bazı laboratuvarlar diğerlerinden daha mı iyi? Bir dı şkı örneğini gönderirlerse veya yalnı zca mikroskop altı nda bakarlarsa veterinere götürmeye değer mi?

Sürekli olarak parazit bulan bir laboratuvar bulamadı k. MetametrixTM parazitleri tanı mladı , ancak kendi deneyimlerimize ve yardı m ettiğim ailelerin deneyimlerine göre tutarlı bir laboratuvar bulamadı k. Bir veterinere yalnı zca parazitleri mikroskopla tanı mlı yorlarsa örnek göndermeye değer.

Combantrin® tablet ve sı vı formda mevcuttur. Hangisi daha iyi?

Sı vı dan nefret ediyorum ve asla kullanmı yorum. Renkler ve tatlar katmı ş olabilir. Katkı sı z kesinlikle bulamazsanı z katkı lı pirantel kullanmak yerine sadece mebendazol kullanı rdı m.

Protokolde neden sistemik ilaç yok?

Bu Protokol ile bunlara gerek yoktur. Parazitleri sistemik ilaçlar olmadan tedavi etmek vücut için çok daha güvenli ve kolaydı r. Mebendazol ve pirantel pamoato kullanan önerilen tedaviler vücut tarafı ndan neredeyse emilmez, yani zaten aşı rı yüklenmiş bir vücuda daha fazla toksin eklemiyoruz.

Bir çocuk ne zaman sistemik ilaçlara ihtiyaç duyar?

Bu sadece tenyalar, kancalı kurtlar, Trichinella spiralis (domuzdan) veya diğer öldürmesi zor helmintlerin neden olduğu sistiserkoz gibi bazı parazitler için gereklidir. Bunlar bir kan testi ile belirlenebilir. Uygulayı cı duruma bağlı olarak sistemik reçete edebilir.

Çocuğumun davranı şları düşerse yeni ayda başlamalı mı yı m?

Tam 18 günlük Kalcker Parazit Protokolü her zaman dolunaydan önce başlar. Bununla birlikte, bazı ebeveynler, yeni ayda 3 gün boyunca parazitleri tedavi ederek, yeni ayı ve dolunayı varsa sı nı rlı sorunlarla atlatabildiklerini keşfettiler.

Ay takviminde dı şkı da solucan olmaması nı n normal olduğu bir zaman var mı ? (Yeni ayda hiç yok.)

Bunu kesin olarak belirlemek için daha fazla araştı rmaya ihtiyaç vardı r.

Machine Translated by Google

Ek 9

Boş Kalcker Parazit Protokol Şeması

Sonraki sayfa, 199 ila 217. sayfalarda bulunanlarla aynı olan boş bir Kalcker Parazit Protokolü Günlük Çizelgesini içerir. Parazit protokol planlamanı zda kullanmak üzere bu çizelgeyi kopyalamanı z önerilir. Fotokopi makinesini %125 oranı nda büyütmek üzere ayarlamak, standart letter boyutlu bir sayfayı doldurmalı dı r.

Machine Translated by Google